

ZOONOSI: PARLIAMO DI VIRUS DELLA RABBIA

NON SOLO UN GENOTIPO...

La rabbia è causata da **sette** genotipi diversi di virus neurotropi appartenenti al genere *Lyssavirus*

L'agente provocatore della rabbia venne scoperto nel

1904

dal virologo, batteriologo
Paul Remlinger

MORFOLOGIA:

è un virus a RNA e presenta una caratteristica forma di proiettile con una lunghezza 180 nm ed un diametro di 75-80 nm.



2 TIPOLOGIE DI CICLI



CICLO URBANO

Questo ciclo interessa l'uomo e colpisce in maniera particolare quei territori soggetti ad **alto randagismo**. Gli animali domestici a differenza di quelli selvatici non costituiscono solo un serbatoio ma un potenziale vettore.

CICLO SILVESTRE

Colpisce gli animali selvatici, tra cui la specie *Vulpes vulpes* che in Europa ne alimenta il ciclo silvestre



SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN ITALIA

Dal 2008 a febbraio 2010, sono stati diagnosticati centinaia di casi di rabbia in animali in **Friuli-Venezia Giulia**, in **Veneto** e nella **Provincia Autonoma di Trento**, riconducibili al ciclo silvestre della rabbia.



METODI DI PREVENZIONE

- Vaccinazione di animali domestici, soprattutto cani randagi o provenienti dall'estero;
- Vaccinazione degli erbivori domestici al pascolo;
- obbligo d'uso del guinzaglio per la condotta del cane in passeggiata;
- monitoraggio sulla fauna selvatica, soprattutto sugli animali trovati morti.