

Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2011

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2011 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le prime segnalazioni regionali di piovanello pettorale e di totano zampegialle minore (quest'ultimo in attesa di conferma dalla COD); lo svernamento di specie occasionali quali cigno minore, oca lombardella minore, oca facciabianca, oca colombaccio, oca collarosso; la comparsa di specie sporadiche come berta maggiore, falco della Regina, falaropo beccosottile, stercoreario mezzano, labbo codalunga, sterna codalunga, calandra, calandrina, lui forestiero, lui di Hume, zigolo minore; la prima nidificazione di chiurlo maggiore, la conferma della nidificazione di cuculo dal ciuffo, ghiandaia marina e picchio rosso minore.

Summary. *Ornithological report for the year 2011 in the Veneto region (NE Italy).*

Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematic order. The most interesting data include first regional record of Pectoral Sandpiper and Lesser Yellowlegs; winter presence of Tundra Swan, Lesser White-fronted, Barnacle, Brant and Red-breasted Geese; sightings of rare species like Cory's Shearwater, Eleonora's Falcon, Red-necked Phalarope, Pomarine and Long-tailed Skua, Arctic Tern, Calandra and Lesser Short-toed Lark, Yellow-browed and Hume's Leaf Warbler, Little Bunting; first breeding of Whimbrel, new breeding data of Great Spotted Cuckoo, Roller and Lesser Spotted Woodpecker.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2011 relative a 155 specie di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 15 specie alloctone e/o fuggite da cattività, oltre a 2 inerenti soggetti ibridi. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione. Per le specie poco frequenti a livello nazionale, qualora disponibile, è stato inserito anche il parere favorevole del Gruppo di validazione delle Specie Rare (GSR) che verifica le segnalazioni inserite nel data base ornitho.it.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia BW; [3] EBN Italia; [4] ornitho.it. Con "censimenti IW" si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.

In conformità con scelte analoghe, la sequenza e la tassonomia seguono la check list degli uccelli italiani per i non-Passeriformi (FRACASSO et al., 2009) mentre si è tenuto conto delle nuove acquisizioni sistematiche per quanto concerne i Passeriformi come nel caso della check-list veneta degli uccelli (SANGSTER et al., 2010 e 2011; FRACASSO et al., 2011). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a VIOLANI & BARBAGLI (2006) e MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes**Anseridae****Cigno nero *Cygnus atratus***

9 indd. a Valle Zignago e 10 indd. in Valle Perera (VE) il 24 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in Valle Moraro (RO) il 14 febbraio (D. Trombin).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 22 aprile e il 4 giugno (L. Boscain, D. Comin, G. Sgorlon et al. [3]); l'1 maggio era presente anche un secondo individuo (L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo, F. Trave [3]).

3 indd. nelle valli Canocchione e Moraro (RO) il 13 giugno (L. Sattin, A. Lucchetta), 2 indd. il 21 giugno (E. Verza, L. Sattin [3]), 1 ind. il 28 giugno e il 30 agosto (L. Boscain, M. Veronese, E. Verza, L. Bedin [3]).

Cigno minore *Cygnus colombianus*

2 indd. in Valle Contarina (VE) il 15 gennaio e successivamente in Valle Morosina (PD) tra il 25 e il 29 gennaio (M. Zenatello, L. Sattin et al.) (fig. 1).

Dovrebbe trattarsi dell'undicesima segnalazione nota per il Veneto di questa specie, la sesta dell'ultimo trentennio; confermata dal GSR.

Oca granaiola *Anser fabalis*

50-200 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra fine dicembre 2010 e febbraio (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin, G. Sgorlon et al. [2][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

1 ind. a Ronchi di Cologna Veneta (VR) il 29 gennaio (C. Izzo, U. Monicelli [1]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano una concentrazione consistente e località inusuali.

Fino a oltre 9.000 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) da metà dicembre 2010 ai primi di marzo (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin, P. Vacilotto, G. Sgorlon, G. Silveri et al. [2][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a) (fig. 2). 1 ind. era parzialmente leucistico.

14 indd. in volo sopra Valle San Leonardo (RO) il 9 gennaio (D. Trombin).

120 indd. ca. in volo sopra Montebelluna (TV) il 16 gennaio (F. Zanatta, S. Gardin [4]).

85 indd. a Maserada del Piave (TV) il 24 gennaio (G. Silveri, F. Zanatta, M. Favero).

120 indd. ca. in volo sopra le Grave di Ciano (TV) il 29 gennaio (G. Silveri [2]).

1 ind. in Valle Ca' Pasta (RO) il 22 novembre (L. Boscain, L. Zanella).

Oca lombardella minore *Anser erythropus*

1 ad. tra Sindacale e Valle Zignago (VE) tra il 31 dicembre 2010 e il 5 gennaio (M. Azzolini, R. Lercio, E. Stival, L. Panzarin [2][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

1 juv. alla Bonifica di Loncon (VE) il 20 gennaio (M. Azzolini [2][3]).

Si tratta della seconda e della terza segnalazione per il Veneto e la provincia di Venezia, l'unica precedente risale al 7 ottobre 1939 in Valle Dogà, mentre un'altra dal Padovano è ritenuta dubbia (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929; SEMENZATO & SCARTON, 1998).

Oca del Canada *Branta canadensis*

Si elencano le segnalazioni al di fuori della provincia di Treviso dove è presente un nucleo insediatosi in seguito a immissioni sul fiume Sile.

1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) il 29 aprile (A. Tonelli).

5 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l'8 giugno (P. Melandri [4]).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1-2 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra il 29 dicembre 2010 e il 5 marzo (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin, L. Boscain et al. [2][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a). Altri 3 indd. dal comportamento "confidente" erano presenti nello stesso periodo all'interno di Valle Zignago (L. Panzarin).

La presenza di individui di dubbia provenienza rende complicato attribuire uno status preciso a questa specie; complessivamente potrebbe essere considerata di comparsa irregolare in Veneto, ma le segnalazioni di individui di verosimile origine selvatica, osservati in periodo invernale in concomitanza di svernamenti numericamente importanti di oche lombardelle o granaiole, dovrebbero essere meno di 10 negli ultimi 50 anni; le segnalazioni elencate sono già state confermate dal GSR.

Oca colombaccio *Branta bernicla*

25-30 indd. in Valle Pierimpiè (VE) il 22 gennaio (fide L. Sattin).

Dovrebbe trattarsi della decima segnalazione nota per il Veneto di questa specie, la terza dell'ultimo trentennio.

Oca collarosso *Branta ruficollis*

Fino a 4 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra il 30 dicembre 2010 e il 5 marzo (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin, L. Boscain et al. [2][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

4 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) a partire dal mese di novembre fino a febbraio 2012, quando sono stati contati 5 indd. (L. Panzarin, M. Azzolini et al. [2][3]).

Dovrebbero rappresentare la sesta e la settima segnalazione per il Veneto di questa specie, tutte in provincia di Venezia; confermate dal GSR.

Casarca *Tadorna ferruginea*

L'origine degli individui elencati è dubbia per la presenza sia di aufughi che di soggetti che originano da popolazioni naturalizzate in Europa.

1 ind. a Valle Zignago (VE) il 13 gennaio (M. Azzolini, M. Chillon et al. [3]).

1 ind. in Palude del Merlo, Caorle (VE), il 9 aprile (G. Sgorlon).

1 ind. in Valle Passarella (RO) l'11 maggio (D. Trombin).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 luglio (P. Utmar [4]).

1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 13 dicembre (M. Crivellari, D. Sartori).

1 ind. alle Cave di Noale (VE) il 30 ottobre (D. Salvato [3]).

1 ind. alle sorgenti del Tione, Pastrengo (VR), il 22 dicembre (C. Zanini [1]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano concentrazioni consistenti e le segnalazioni in acque interne.

1 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 6 e il 16 gennaio (F. Salvini, N. Barp, M.E. Bibelia [4]).

5.330 indd. in Valle Ca' Pisani e 2.713 indd. in Valle Ca' Zuliani per un totale di 8.043 indd. nel Delta del Po (RO) l'11 gennaio (L. Cogo, M. Veronese, A. Bocchi, M. Bovo, M. Carnacina, P. Ronconi).

3.019 indd. in Valle Dogà (VE) e un totale di 6.321 in Laguna di Venezia il 25 gennaio (censimenti IW).

1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR), il 12 marzo (G. Fasoli [4]).

10 indd. nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 20 marzo (R. Lerco [1]).

1 ind. nato nell'anno a Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR), il 6 agosto (D. Bernasconi [1]).

2 indd. al Lago di Busche (BL) il 6 agosto (F. Salvini, N. Barp [4]).

10 indd. nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 28 novembre e 1 ind. il 30 novembre (A. Mosele, C. Zanini, M. Sighele [1]).

1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR), il 7 dicembre (M. Sighele, R. Lerco, I. Falco [1]).

8.025 indd. nelle valli di Porto Viro e 2.439 indd. nelle valli di Porto Tolle per un totale di 10.464 indd. nel Delta del Po (RO) il 13 dicembre (censimenti Sagittaria).

Fischione *Anas penelope*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

23.630 indd. in Valle Canocchione-Moraro (RO) l'11 gennaio (L. Stoppa, D. Trombin).

14.670 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 25 gennaio (censimenti IW).

Canapiglia *Anas strepera*

Si elencano la concentrazione più consistente e informazioni relative alla nidificazione.

1.291 indd. in golena Carpano, Po di Maistra, e 298 indd. in Valle Ripiego (RO) l'11 gennaio (A. Bocchi, D. Trombin, L. Bedin, C. Ogniben).

La specie si conferma nidificante con 30-50 cpp. nel Delta del Po (RO), in particolare nelle valli di Porto Tolle (E. Verza, com. pers.).

Alzavola *Anas crecca*

Si elencano concentrazioni consistenti.

9.852 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 gennaio (A. Bocchi, M. Bovo, M. Carnacina, P. Ronconi).

39.800 indd. in Valle Serraglia (VE) e 18.017 in Valle Morosina (PD) per un totale di 93.186 indd. in Laguna di Venezia il 25 gennaio (censimenti IW).

6.400-7.000 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) tra il 22 novembre e il 27 dicembre (L. Bedin, E. Santoro, R. Andreoli).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si elencano concentrazioni consistenti.

9.030 indd. in Valle Dogà (VE) e 9.887 in Valle Morosina (PD) per un totale di 55.322 in Laguna di Venezia il 25 gennaio (censimenti IW).

11.780 indd. in Valle Canocchione-Moraro e 4.008 indd. in Valle Sacchetta per un totale di 15.788 indd. nel Delta del Po (RO) il 30 agosto (L. Bedin, E. Verza, L. Boscain, E. Santoro).

Codone *Anas acuta*

Si elenca la concentrazione più consistente.

5.202 indd. in Valle Dogà (VE) e un totale di 9.539 in Laguna di Venezia il 25 gennaio (censimenti IW).

Marzaiola *Anas querquedula*

Si elenca la concentrazione più consistente.

3.150 indd. in Valle Canocchione-Moraro (RO) il 30 agosto (L. Bedin, E. Verza).

Mestolone *Anas clypeata*

Si elencano concentrazioni consistenti.

3.747 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 gennaio (A. Bocchi, M. Bovo, M. Carnacina, P. Ronconi).

4.200 indd. in Valle Ca' Pasta (RO) il 27 dicembre (M. Crivellari, M. Veronese).

Fistione turco *Netta rufina*

Specie di presenza regolare e nidificante localizzata e sporadica, si elencano gli unici siti di nidificazione nell'anno e le concentrazioni più consistenti.

63 indd. a Valle Vecchia (VE) il 24 gennaio (censimenti IW).

Almeno 36 indd. sul Lago di Garda tra Torri del Benaco e Navene (VR) il 26 marzo (M. Sighele, A. Pigozzo, C. Chiappisi [1]).

30 indd. a Lazise (VR) il 7 maggio (A. Mosele [1]).

Nidificazione accertata sul Lago di Garda (VR) a Lido Campanello, Castelnuovo d/G, con 1 f. con 13 pulli il 30 aprile (C. Chiappisi, C. Izzo, M. D'Offria [1]); a Malcesine con 2 ff. con pulli osservati a partire dal 13 giugno (A. Gargioni, O. Negra); a Peschiera d/G con 1 f. con 9 pulli il 2 luglio (P. Parricelli [1]).

Ha nuovamente nidificato anche a Valle Vecchia di Caorle (VE) con una decina di coppie stimate (G. Sgorlon); il 10 maggio sono stati contati 50 indd. e almeno due nidiate di 8 e 10 pulli (P. Vacilotto et al. [3]).

Moriglione *Aythya ferina*

Si elenca la concentrazione più consistente.

Circa 2.000 indd. in Valle Sacchetta (RO) l'8 novembre (E. Verza).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano i casi di svernamento, i gruppi più consistenti e le segnalazioni in periodo riproduttivo.

5 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 gennaio (P. Vacilotto [3]). In questo sito la specie è stata segnalata fino al 10 maggio e successivamente dal 23 luglio in poi (L. Boscain, A. Bossi, P. Vacilotto et al.), con conteggi massimi di 10 indd. in marzo e il 15 agosto (L. Boscain, E. Stival, D. Comin). 3 indd. erano presenti anche il 31 dicembre (P. Vacilotto [3]).

1 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 gennaio (A. Bocchi, M. Bovo, M. Carnacina, P. Ronconi).

1 cp. in Valle San Carlo (RO) il 6 maggio (D. Trombin [3]).

1 ind. alla Palude del Busatello (VR) l'11 maggio (F. Novelli [1]).

1 m. sul lago inferiore di Quinto di Treviso fino a fine maggio (F. Salvini).

Aythya ferina* x *Aythya nyroca

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 17 marzo (L. Boscain).

Moretta *Aythya fuligula*

Specie svernante regolare, nidificante scarsa, si elencano la concentrazione più consistente e dati relativi alla nidificazione nelle province di Rovigo, Belluno e Treviso.

2.650 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 12 gennaio (M. Sighele et al. [1]).

Accertata la nidificazione all'interno delle valli di Porto Tolle (RO); nel Delta del Po la specie appare in lenta ma costante espansione (E. Verza, com. pers.).

Nidificazione confermata anche nel 2011 al laghetto del Vincheto di Celarda (BL) con la presenza di 3 ff. con 17 pulli il 17 luglio (N. Barp) e al Lago di Busche (BL) con la presenza di 1 f. con 7 pulli a partire dal 27 giugno (N. Barp, F. Salvini).

Nidificazioni accertate di almeno 12 cpp. al Parco del Fiume Sile (TV) nei comuni di Istrana, Quinto di Treviso, Morgano e Treviso con la presenza di pulli a partire dal 7 luglio (F. Salvini, R. Storer), con presenza di nidiate tardive osservate nel mese di agosto (F. Mezzavilla, F. Salvini).

Moretta grigia *Aythya marila*

Da 1 a 9 indd. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 31 dicembre e il 6 aprile (M. & G. Sighele, P. Bertini, C. Zanini et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

1 m. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 12 e il 21 marzo (L. Prada, C. Nava, A. Bertotto et al. [3]).

Edredone *Somateria mollissima*

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 3 giugno (L. Boscain, L. Zanella [3]).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

1 m. al Laghetto del Frassino (VR) dal 30 dicembre 2010 fino al 2 aprile (R. Lerco, M. & G. Sighele, M. D'Offria et al. [1][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a) (fig. 3).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

27 indd. nel tratto di litorale Po di Tolle-Bastimento (RO) il 14 gennaio (D. Trombin, M. Veronese).

32 indd. a Bibione (VE) il 24 gennaio (Censimenti IW).

1 ind. a Bibione (VE) il 10 dicembre (E. Stival, A. Lucchetta, L. Mamprin [2][3]).

Orco marino *Melanitta fusca*

Specie migratrice e svernante regolare, ma piuttosto scarsa, si elencano tutte le osservazioni note.

1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 28 dicembre 2010 e il 18 marzo (M. Sighele, C. Chiappisi, V. Fanelli, P. Bertini et al. [1][3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

1 ind. a Lazise (VR) il 9 gennaio (R. Lerco et al. [1]).

Almeno 35 indd. a Porto Santa Magherita (VE) il 12 novembre in un gruppo non meglio identificato di 220-230 indd. di *Melanitta* sp. (F. Mezzavilla - MORUS, 2012).

1 ind. in volo lungo il litorale di Valle Vecchia di Caorle (VE) il 13 novembre (L. Boscain, M. & L. Crivellari, P. Schlagenauf).

2 indd. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), il 26 dicembre (M. Sighele, R. Vignola [1]).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 f. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 4 giugno (G. Sgorlon [2]).

Pesciola *Mergellus albellus*

1 m. a Marengo, Caorle (VE), l'8 gennaio (M. Ballan, D. Fasano [2]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 marzo (F. Piccolo, F. Trave [2][3]).

Smergo minore *Mergus serrator*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 f. a Porto Levante (RO) il 28 giugno (L. Boscain).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano le segnalazioni al di fuori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, dove la specie è osservata tutto l'anno e nidificante.

1 f. a Malcesine (VR) il 2 gennaio (M. Sacchi [4]).

2-6 indd. tra Punta San Vigilio e Castelletto di Brenzone (VR) tra l'11 gennaio e il 19 febbraio (L. Mazzola, M. Sighele, R. Lerco, P. Bertini [1]), e ancora 2 ff. a Pai (VR) il 5 aprile (L. Mazzola [1]).

1 f. sull'Adige ad Arcè, Pescantina (VR), il 15 gennaio (C. Zanini, V. Fanelli, A. Pigozzo [1]).

1 m. nel fossato del Forte Gazzera a Mestre (VE) il 18 e il 20 febbraio (S. Zampedi, E. Stival [2][3]).

2 indd. a Campagnola di Malcesine (VR) il 30 novembre (P. Bertini [1]).

1 ind. a Torri del Benaco (VR) tra l'8 e l'11 dicembre (R. Lerco, G. Dalle Vedove [1]).

2 indd. alla Lama di Revelino (VE) il 13 dicembre (L. Panzarin).

Galliformes**Tetraonidae****Pernice bianca *Lagopus muta***

Si riporta una segnalazione al di fuori dei siti noti.

1 ind. ritrovato deceduto, forse per impatto con cavi elettrici, sulle cime del Monte Baldo (VR) il 5 marzo (M. Manotti).

Gaviiformes**Gaviidae****Strolaga minore *Gavia stellata***

Specie migratrice regolare, ma piuttosto scarsa, si elencano tutte le osservazioni note.

1 ind. lungo il litorale di Valle Vecchia di Caorle e 1 ind. a Jesolo (VE) il 13 novembre (L. Boscain, M. & L. Crivellari, P. Schlagenauf, G. Sgorlon [3]).

1 ind. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), tra il 30 novembre e il 24 dicembre (M. Sighele, C. Zanini, M. D'Offria, E. Cavallini et al. [3]).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Specie migratrice e svernante regolare in mare e sul Lago di Garda, si elencano le concentrazioni più consistenti.

30 indd. sul Lago di Garda (VR) tra Garda e Navene il 9 gennaio (P. Schlagenauf, L. Crivellari, C. Izzo, G. Volcan et al. [1]) e 25 indd. il 6 febbraio (P. Bertini [1]).

17 indd. sul Lago di Garda (VR) tra Torri del Benaco e Pai e 1 ind. a Lido Ronchi, Lazise, il 30 novembre (P. Bertini, M. Sighele [1]).

Pelecaniformes**Procellariidae****Berta maggiore *Calonectris diomedea***

4-6 indd. alla bocca del Tagliamento (VE) il 31 ottobre (G. Piras, C. Fassina).

Dovrebbe rappresentare la quinta segnalazione degli ultimi cinquant'anni per la provincia di Venezia e per il Veneto, anche se forse mancano ricerche adeguate per questa specie.

Berta minore *Puffinus yelkouan*

2 indd. a Porto Baseleghe (VE) il 31 agosto (G. Rizzi).

Sulidae**Sula *Morus bassanus***

1 ind. a Eraclea Mare (VE) il 21 maggio e 2 indd. il 22 maggio (F. Piccolo, E. Stival, G. Sgorlon [2][3]).

1 ind. al largo di Jesolo (VE) il 4 giugno (M. Borsetta).

3 indd. davanti allo Scanno del Canarin (RO) il 24 giugno (D. Trombin, L. Zanella).

Phalacrocoracidae**Cormorano *Phalacrocorax carbo***

Si riportano una concentrazione consistente e informazioni relative alla nidificazione.

La specie ha nuovamente nidificato in provincia di Venezia in Valle Dogà, Valle Figheri e stagno Montedipe (M. Bon, com. pers.).

4.800 indd. al roost nell'area del Delta del Po (RO) il 27 dicembre (censimenti Sagittaria).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

Si riporta la concentrazione più consistente.

230 indd. in Laguna Sud di Venezia il 15 giugno (L. Sattin, A. Lucchetta).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

Si elencano concentrazioni consistenti, località inusuali in provincia di Rovigo e siti recenti di nidificazione.

2.139 indd. al roost del Po di Maistra (RO) l'11 gennaio (censimenti Sagittaria).

1 ind. a Panarella di Papozze (RO) il 9 aprile (D. Trombin).

Nidificazione confermata all'Oasi Cave di Gaggio Nord, Marcon (VE), con la stima di 85 cpp. nidificanti, attive a partire almeno da inizio aprile (M. Pegorer). Nel 2009 era stata censita 1 sola cp., mentre nel 2010 erano stati stimati 18 nidi attivi (cfr. SIGHELE et al., 2010 e 2011a).

Nuovo sito riproduttivo in Valle Zignago (VE), dove il 4 giugno sono stati censiti 38 nidi all'interno di una colonia mista con cormorano ed airone cenerino (L. Panzarin, G. Sgorlon).

Almeno 10 nidi con pulli ben sviluppati in Valle Serraglia (VE) il 23 giugno (fide L. Sattin).

Alcune coppie, presenti anche nel 2010, hanno nidificato in Valle Averso (VE) (fide R. Borgo).

1 ind. nelle cave di Calto (RO) il 14 settembre (A. Galasso).

2.576 indd. ai roost del Po di Maistra e di Tolle (RO) il 27 dicembre (censimenti Sagittaria).

Ciconiiformes**Ardeidae****Tarabuso *Botaurus stellaris***

Si elencano osservazioni in periodo inusuale.

1 ind. in Valle Grassabò (VE) osservato più volte a maggio (E. Stival, M. Bon).

1 ind. allo zuccherificio di Contarina (RO) il 30 agosto (L. Stoppa, L. Zanella).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Si elencano concentrazioni consistenti al di fuori del periodo riproduttivo.

100 indd. nel tratto di fiume Adige tra la S.S. Romea e la foce (VE) il 10 gennaio (L. Bedin, M. Bovo, L. Stoppa).

190 indd. in Valle Dogà (VE) il 25 gennaio (censimenti IW).

81 indd. in Po di Maistra, golena Carpano (RO), l'11 febbraio (L. Bedin, A. Bocchi).

78-92 indd. in Po di Maistra, golena Carpano (RO), tra il 22 novembre e il 13 dicembre (L. Boscain, L. Zanella, R. Andreoli, L. Bedin).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Si elencano le concentrazioni più consistenti al di fuori del periodo riproduttivo e quelle effettuate in siti inusuali.

300 indd. stimati alla Piana di Nervesa della Battaglia (TV) il 5 novembre (G.C. Lorenzon).

480 indd. a un roost a Castelfranco Veneto (TV) l'11 dicembre, con stime complessive di almeno 600 indd. a fine anno nel Trevigiano (G. Silveri [3]).

Alcuni indd. sono stati osservati in quota in Lessinia (VR) a fine dicembre: 2 indd. a San Rocco di Piegara, 640 m s.l.m., il 25 dicembre (C. Chiappisi [1]); 4 indd. a Selva di Progno, 650 m s.l.m., il 28 dicembre (L. Signori [1]); 30 indd. in contrada Regno di Bosco Chiesanuova, 780 m s.l.m., il 28 dicembre, e in seguito 2 indd. almeno fino al 7 gennaio 2012 (C. Gandini, M. Sauro, P. Parricelli, M. Sighele [1]).

***Egretta* sp.**

- 1 ind., probabile ibrido *Egretta garzetta* x *Egretta gularis*, in Valle Perini (VE) dal 14 al 29 giugno (M. Bon).
 1 ind., probabile ibrido *Egretta garzetta* x *Egretta gularis*, in Valle Sacchetta (RO) il 30 agosto (L. Boscain, E. Santoro [3]).

Ciconiidae**Cicogna nera *Ciconia nigra***

- 1 ind. tra Chioggia e Cavanella d'Adige (VE) alla fine di marzo (fide E. Verza).
 1 ind. tra Peschiera d/G ed Affi (VR) il 29 marzo (M. Belardi [1]).
 1 ind. a Cimadolmo (TV) il 7 aprile (F. Zanatta [4]).
 1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) il 4 maggio (A. Tonelli).
 1 ind. a Zevio (VR) il 7 maggio (R. Pistollato [1]).
 1 ind. a Villaviera di Caorle (VE) il 19 maggio (K. Battiston, D. Fasano [2]).
 6 indd. a Campagnamagra, Vigasio (VR), l'11 agosto (A. Mosele [1]).
 Almeno 1 subad. e 1 juv. in Lessinia (VR) per un mese a partire dalla metà di agosto, tra i 1.300 e i 1.500 m s.l.m.:
 1 ind. a Sauro il 15 agosto (D. Valbusa); 1 ind. a Malga Masetto il 29 agosto (F. Leso, R. Leso [1]); 1 ind. a Malga Saibe il 7 settembre (L. Signori); 1 ind. a San Giorgio il 9 settembre (D. Ponticello [1]); 1 ind. ancora a Malga Masetto l'11 settembre (G. Boselli).
 Sui Colli Asolani (TV) 2 indd. il 25 agosto, 2 indd. il 27 agosto, 1 ind. il 3 settembre e 2 indd. il 6 settembre (F. Piccolo, G. Martignago, F. Salvini, G. Della Pietà, G. Silveri et al.).
 2 indd. alle Grave di Ciano (TV) il 15 settembre (G. Silveri [4]).
 1 ind. nei pressi di Pederobba (TV) il 14 ottobre (G. Silveri [3]).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Si elencano le segnalazioni di individui marcati.

- 1 ind. all'Oasi Cervara (TV) tra il 3 dicembre 2010 e il 4 marzo, marcato con anello italiano "IATF" (E. Ramponi [3]); era stato inanellato al Centro Cicogne LIPU di Silea (TV).
 2 indd. a Povegliano Veronese (TV) il 14 e il 15 settembre, di cui uno marcato con anello tedesco "DER 3339" (G. Bovo, E. Cavallini [1]); era stato inanellato da pullo nel 2003 in Germania nei pressi di Frensdorf, segnalato da allora anche in Francia e in Spagna.

Threskiornithidae**Mignattaio *Plegadis falcinellus***

- 2 indd. in Valle Chiusa (RO) il 7 aprile (R. Andreoli, D. Trombin).
 1 ind. in Valle Paliaga (VE) tra il 9 aprile e il 3 maggio (E. Stival, A. Bossi, L. Busatto [2][3]).
 1 ind. a Mira (VE) il 28 aprile (F. Piccolo [3]).
 3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 maggio (A. Bossi).
 1 ind. alle vasche di Camacici (VR) il 22 maggio (M. Sighele [1]).
 1 ind. nei pressi a Barricata (RO) il 7 giugno (P. Melandri [4]).
 2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 agosto (F. Piccolo).
 2 indd. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 25 agosto (R. Lercio [1]).
 13 indd. a Santa Lucia dei Monti, Valeggio sul Mincio (VR), il 3 settembre (R. Rigon, A.M. Kleiber).
 1 ind. alla Palude della Cona (VE) il 30 settembre (E. Stival).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

- 1 ind. a Novoledo di Villaverla (VI) il 9 marzo (S. Dal Cengio, L. Sebastiani [3]).
- 1 ind. a Sant'Anna di Chioggia (VE) il 23 febbraio (M. Veronese).
- 1 ind. nei pressi di Chioggia (VE) il 19 marzo (E. Verza, D. Trombin).
- 1 ind. in volo a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 26 marzo (C. Izzo, M. Allen [1]).
- 2 indd. tra Montalto, Nogara, e Sorgà (VR) tra il 7 e il 12 aprile (R. Lercio, A. Mosele, M. Sighele et al. [1]).
- 1 ind. a Giare di Mira (VE) il 10 aprile, 1 ind. in mobbing su Falco di palude a Porto Marghera (VE) il 13 aprile e
- 1 ind. in Cassa di Colmata A (VE) il 24 aprile (B. Selmin, M. Semenzato, L. Mauro [4]).
- 1 ind. nelle risaie di Isola della Scala (VR) il 26 aprile e il 22 maggio (P. Bertini, G. Dalle Vedove [1][4]).
- 3 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 10 maggio (P. Ronconi, M. Veronese).
- 3 indd. all'Oasi di Ca' Mello (RO) il 31 maggio (N. Donà).
- 10 indd. ca. nei pressi di Barricata (RO) il 7 giugno (P. Melandri [4]).
- 1 ind. nei pressi di Chioggia (VE) il 13 giugno (A. Lucchetta, L. Sattin).
- 1 ind. alla garzaia di Pederobba (TV) il 22 giugno (G. Silveri [3]).
- 2 indd. su una barena nei pressi del terminal di San Leonardo (VE) l'11 luglio (F. Scarton).
- 1 ind. al Canale Bondantino (VE) il 19 luglio (S. Beda).
- 1 ind. a Ca' Noghera (VE) il 28 luglio (A. Franchin).
- 1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 16 agosto (C. Chiodin).
- 1 ind. a Ca' Noghera (VE) il 13 e il 19 novembre (E. Stival [2]).
- 11-19 indd. nei pressi della Palude del Feniletto, Vallese di Oppeano (VR), tra il 12 e il 17 dicembre (R. Pistollato, D. Turri et al. [1]); successivamente nella stessa zona è stato osservato 1 ind. almeno fino alla fine di gennaio 2012 (R. Pistollato, M. Sighele [1]).
- 8 indd. in volo sopra Palude Pellegrina (VR) il 17 dicembre (M. Sighele, M. Allen [1]).

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano concentrazioni consistenti, un importante conteggio in periodo invernale, segnalazioni in località inusuale e di un individuo marcato.

- 2 indd. a Negrizia di Ponte di Piave (TV) il 10 febbraio (G.C. Lorenzon); specie poco conosciuta in provincia di Treviso.
- 1 ind. nella Palude della Cona (VE) il 15 aprile, marcato con anello italiano "IFBP" (E. Stival); era stato inanellato da pullo a Comacchio (FE) nell'aprile 2010 (archivio ISPRA).
- 82 indd. in Valle Ca' Zuliani e 15 indd. in Valle Chiusa (RO) il 30 agosto (R. Andreoli, D. Trombin, M. Chillon, M. Veronese).
- 126 indd. in Valle Dogà (VE) l'1 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi, N. Pagani Cesa et al. [2][3]).
- 50 indd. in Valle Ca' Pasta (RO) il 27 dicembre (M. Crivellari, M. Veronese).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopiterus roseus*

Si elencano concentrazioni consistenti, segnalazioni di individui marcati e in località inusuali.

- 1 ind. a Montalto, Nogara (VR) a gennaio e 3 indd. ai primi di marzo (fide M. Sighele [1]).
- 2.945 indd. in Valle Pozzatini (RO) il 9 marzo (A. Bocchi, L. Boscain).
- 3.000 indd. stimati in Valle Dogà (VE) il 23 marzo (L. Panzarin).
- 1 ind. a Ronchi di Cologna Veneta (VR) a metà aprile (fide R. Pistollato).
- 2 indd. marcati da pulli a Comacchio (FE) osservati in Valle Grassabò (VE) il 30 maggio (E. Stival, M. Bon): 1 ind. con anello "ISVJ" che era stato inanellato nel luglio 2009 ed era stato segnalato anche nel Delta del Po (RO) nell'aprile 2010; 1 ind. con anello "E:ADA" che era stato inanellato nel luglio 2010 (archivio ISPRA).
- 1 ind. in Valle Pozzatini (RO) il 19 giugno, marcato con anello italiano "INHH" (E. Stival): era stato inanellato da pullo a Comacchio (FE) nel luglio 2008 (archivio ISPRA).

In Valle Ripiego (RO) il 30 agosto almeno 5 indd. erano marcati, 3 con anelli spagnoli e 2 italiani (E. Stival); i due italiani erano stati inanellati pulli a Comacchio (FE): 1 ind. con anello "IPZS" nel luglio 2009; 1 ind. con anello "IZJV" nel luglio 2010 (archivio ISPRA).

Podicipediformes

Podicipedidae

Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*

Si elencano segnalazioni in quota in periodo riproduttivo.

1 cp. sul Lago di Misurina, 1.750 m s.l.m., e 1 cp. sul Lago d'Antorno (BL), 1.870 m s.l.m., il 3 giugno (A. Peri [4]); la specie si riproduce regolarmente nei due laghi da alcuni anni (G. Fracasso, com. pers.).

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

Si elencano concentrazioni consistenti.

1.396 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 9 gennaio (censimenti IW).
480-500 indd. tra Sacca Cavallari e Laguna Vallona (RO) il 30 agosto (L. Boscain).

Svasso coloroso *Podiceps grisegena*

1 ind. a Lazise (VR) il 9 gennaio (censimenti IW [1]).
1 ind. in Sacca Cavallari (RO) l'11 gennaio (L. Boscain, F. Piccolo).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 gennaio (A. Bocchi, D. Trombin).
1 ind. a Pellestrina (VE) il 14 gennaio (E. Stival, M. Bon [2][3]).
1 ind. a Ca' Ballarin (VE) il 25 gennaio (A. Sartori, M. Chillon).
3 indd. in Laguna Sud di Venezia il 4 febbraio (S. Di Carlo, M. Basso et al. [3]).
2 indd. a Pai (VR) il 6 febbraio e 1 ind. il 12 febbraio (P. Bertini, R. Bonetti [1]).
1 ind. nel Canale Passaora (VE) il 7 febbraio (E. Stival, M. Bon, F. Scarton [2]).
1 ind. a Navene, Malcesine (VR) il 27 novembre (G. Speranza [1]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 21 gennaio (censimenti IW).

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si elencano conteggi durante la migrazione post-riproduttiva e una presenza in periodo inusuale.

Durante la migrazione post-riproduttiva sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) sono stati conteggiati 11.665 indd. tra il 14 agosto e il 6 settembre con picco di 1.852 indd. il 28 agosto (GARGIONI, 2011). Del tutto analoghi i conteggi sui Colli Asolani (BL/TV), dove sono stati contati 10.508 indd. con picco di circa 1.800 indd. proprio il 28 agosto (MEZZAVILLA et al., 2011).

1 ind. recuperato debilitato a Panarella di Papozze (RO) il 15 ottobre (E. Verza et al.).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Si riporta una segnalazione in periodo riproduttivo in provincia di Padova, dove non sono note nidificazioni.

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 9 maggio che trasportava un ramo (A. Tonelli [2][3]); osservato anche la settimana successiva, ma in seguito non più ricontattato (S. Bottazzo).

Nibbio reale *Milvus milvus*

1 ind. alla Bonifica di Loncon (VE) il 7 febbraio, al mattino (M. Azzolini, R. Della Putta, G. Commisso [2][3]) e
1 ind. a Lison, Portogruaro (VE), nel pomeriggio, forse lo stesso soggetto (D. Fasano, M. Ballan [2]).
1 ind. a Olmo di Oriago (VE) il 19 febbraio (L. Sattin [2]).
1 ind. a Montalto, Nogara (VR), il 20 marzo (A. Pigozzo, M. Sighele [1]).
1 ind. sopra la garzaia di Pederobba (TV) il 7 aprile e 1 ind. a Onigo (TV) il 22 aprile (G. Silveri [3]).
1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 30 settembre (A. Mosele [1]).

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. a San Donato, Villaga (VI), l'11 marzo (R. Fiorentin).
1 ind. a San Giorgio di Perlena, Fara Vicentino (VI), il 22 settembre (R. Fiorentin).
1 ind. a Belluno il 23 ottobre (F. Corvaja [3]).

Astore *Accipiter gentilis*

Si riporta una segnalazione in località inusuale.

1 ind. del 1° calendario a Faè di Oderzo (TV) il 23 novembre (G. Sgorlon [2][3]).

Poiana *Buteo buteo*

Si riporta una segnalazione attribuita alla ssp. *vulpinus* (Poiana delle steppe).

3 indd. a San Dona' di Piave (VE) il 25 aprile (A. Nardo [3]).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

1 ind. a Santa Lucia dei Monti, Valeggio sul Mincio (VR), il 29 agosto (P. Bonvicini [3]), descritto.
1 ind. sulla Duna Gozzi di S. Basilio, Ariano nel Polesine (RO) il 7 settembre (L. Boscain [3]), fotografato.
Sono almeno 15 le osservazioni in Veneto nell'ultimo decennio, ma solo in 7 diversi anni. Sarebbe auspicabile fornire commenti o immagini di conforto per possibili equivoci con *Buteo buteo*.

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ind. nei canneti del Bacucco, foce del Po di Gnocca (RO) il 14 gennaio (L. Bedin, A. Bocchi [3]).
1 ind. a Valle Zignago (VE) in gennaio (D. Polito).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 marzo (F. Piccolo, F. Trave [2][3]).

Aquila minore *Aquila pennata*

1 ind. a Rosolina Mare (RO) il 20 gennaio (L. Bedin).
1 ind. sul Colle San Giorgio, Colli Asolani (TV), il 13 agosto (F. Piccolo et al. [3]).
2 indd. in Val Squaranto (VR) il 14 agosto (C. Izzo [1]).
1 ind. sul Monte Tomba, Pederobba (TV), il 25 agosto (F. Mezzavilla).
1 ind. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 30 agosto (A. Gargioni, G. Dalle Vedove).
1 ind. a Oderzo (TV) il 27 settembre e 1 ind. l'1 ottobre, individui diversi per differente colore del piumaggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. a Marano Vicentino (VI) il 7 ottobre (L. Sebastiani).
1 ind. ad Arquà Petrarca (PD) il 22 ottobre (S. Bottazzo [3]).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. presso Bacino Villa a Caorle (VE) il 22 aprile (L. Boscain, D. Comin [2][3]).

Falconidae**Grillaio *Falco naumanni***

1 m. a Faè di Oderzo (TV) il 21 aprile (G. Sgorlon [2][3]).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Migratore regolare e nidificante assai scarso e localizzato, si riporta un dato riproduttivo.

Nei pressi della località La Salute, Santo Stino di Livenza (VE), 1 m. trasportava una preda il 19 luglio, 2 indd. erano presenti il 31 luglio e 1 cp. si accompagnava a 2 juvv. da poco involati l'11 agosto (L. Panzarin, J. Bos [2][3][4]). La specie si riproduce in Veneto con una certa regolarità dal 2003, anche se nel 2006 e nel 2010 la riproduzione è stata ritenuta solamente probabile (SGORLON, 2008; SIGHELE et al., 2009, 2010 e 2011a).

Falco della Regina *Falco eleonorae*

1 ind. a Valle Bagliona (RO) il 20 maggio (L. Boscain [3]).

1 ind. sul Colle San Giorgio, Colli Asolani (TV), il 19 agosto (F. Piccolo, G. Martignago, G. Della Pietà [3]) (fig. 4).

2 indd. del 2° calendario sopra Verona il 28 agosto (SIGHELE et al., 2011b).

Si tratta della nona, decima e undicesima segnalazione per il Veneto; tutte le osservazioni venete di questa specie sono state effettuate a partire dal 1996.

Gruiformes**Rallidae****Re di quaglie *Crex crex***

Si elencano segnalazioni in località o periodo inusuali.

1 ind. in Contrada Merli, Lessinia (VR), tra il 9 e il 19 luglio (P. Parricelli, G. & M. Sighele et al. [1]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 29 novembre (G. Silveri [2]).

Folaga *Fulica atra*

Si elencano concentrazioni consistenti.

6.514 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 9 gennaio (censimenti IW).

7.494 indd. in Valle Canocchione-Moraro (RO) il 22 novembre (R. Andreoli, M. Crivellari, D. Trombin).

Gruidae**Gru *Grus grus***

Specie migratrice regolare, si riportano le osservazioni di gruppi numerosi e le segnalazioni invernali.

9 indd. sopra Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (M. Azzolini, G. Sgorlon, S. Colaone [3]).
Fino a 22 indd. in sosta alle Grave di Ciano (TV) nel mese di gennaio (G. Silveri et al. [3]).
100 indd. sopra le barene di Campalto (VE) il 22 febbraio (S. Zampedri [2]).
120 indd. sopra Valle Vecchia di Caorle (VE) il 22 febbraio (D. Fasano, M. Ballan [2]).
110 indd. sopra Cendon, Silea (TV) il 24 febbraio (F. Mezzavilla).
220 indd. sopra l'Oasi Stagni di Casale (VI) il 24 febbraio (F. Farinello, E. Cerato [3]).
1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 17 dicembre (M. Allen, M. Sighele, P. Bertini [1]).
9 indd. a Valle Pierimpiè (VE) il 21 dicembre (S. Ercoli [4]).

Charadriiformes

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni di individui marcati.

118 indd. in Sacca di Scardovari e Bottonera (RO) il 12 gennaio (A. Bocchi, D. Trombin).
1 ind. in Laguna di Venezia l'1 luglio, marcato con anello italiano "J19" (E. Stival); era stato inanellato da pullo nei pressi di Barricata (RO) nel maggio 2005 ed era già stato segnalato in Laguna di Venezia nel luglio 2009 (archivio ISPRA).

Recurvirostridae

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Si riporta una segnalazione di individuo marcato.

1 ind. in risaia a Vigasio (VR) il 18 e il 19 aprile, marcato con anello italiano "IDHA" (A. Mosele [1]); era stato inanellato da adulto alle Valli di Mirandola (MO) il 27 giugno 2010 (archivio ISPRA).

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Si elencano la concentrazione più consistente al di fuori del Delta del Po di Rovigo e una segnalazione in località inusuale.

700 indd. in Palude della Cona (VE) il 25 gennaio (A. Sartori).
2 indd. in risaia a Gabbia, Salizzole (VR), il 25 e il 26 aprile (G. Fasoli, P. Bertini [1]).

Burhinidae

Occhione *Burhinus oedicnemus*

La specie è stata segnalata esclusivamente in provincia di Treviso, dove è presente l'unica area regionale nota di nidificazione.

1-2 indd. sul Piave a Pederobba, Cimadolmo e Maserada (TV) tra il 6 aprile e il 17 maggio e 1 ind. a Pederobba l'8 agosto (G. Silveri, F. Zanatta, L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo, F. Trave [3]).
25 indd. a Spresiano (TV) a fine ottobre, quindi il numero si è progressivamente ridotto nelle settimane successive, 6 indd. ancora presenti il 6 dicembre (A. Barbon, F. Zanatta [4]).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 29 novembre (G. Silveri).

Glareolidae

Pernice di mare *Glareola pratincola*

Si riporta una segnalazione al di fuori del Delta del Po di Rovigo, dove nidificano regolarmente 15-20 cpp.

1 ind. al Porto di Falconera di Caorle e in Valle Nova (VE) il 22 maggio (L. Panzarin [2]).

Charadriidae

Fratino *Charadrius alexandrinus*

Si riporta una segnalazione di individui marcati.

2 indd. a Malamocco (VE) tra il 9 aprile e il 17 luglio, marcati con anello italiano "DK" e "DL" (M.G. Mitri, M. Basso, O. Trebbi et al.); entrambi erano stati marcati come o da adulti il 26 aprile 2010 proprio a Malamocco (archivio ISPRA).

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Si elencano le segnalazioni primaverili e quelle successive al mese di settembre.

1 ind. a Cimdolmo (TV) il 6 aprile (F. Zanatta [4]).

1 ind. sul Monte Grappa (TV) il 10 aprile (F. Piccolo, A. Tonelli et al.).

1 ind. a Cimdolmo (TV) il 2 ottobre (F. Zanatta [4]).

1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) l'8 ottobre (L. Boscain, G. Della Pietà).

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'ambiente costiero.

1-2 indd. nelle risaie di Trevenzuolo e Isola della Scala (VR), tra il 2 e il 9 maggio (A. Mosele, M. & G. Sighele, E. Cavallini et al. [1]).

Scolopacidae

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Migratore regolare, ma scarso, si elencano concentrazioni interessanti.

25 indd. ad Albarella (RO) il 10 gennaio (D. Trombin, M. Veronese).

19-21 indd. a Porto Baseleghe (VE) il 12 aprile e 14 indd. l'1 maggio (L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo, F. Trave).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Si elencano la concentrazione più consistente e una segnalazione al di fuori dell'ambiente costiero.

83 indd. ad Albarella (RO) il 10 gennaio (D. Trombin, M. Veronese).

2 indd. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 3 maggio e 1 ind. il 10 maggio (A. Mosele, M. & G. Sighele, R. Lerco [1]).

Piovanello pettorale *Calidris melanotos*

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 16 maggio (P. Bertini, A. Mosele, M. & G. Sighele, M. Allen, C. Izzo [1][3]).

Si tratta della prima segnalazione nota per il Veneto; confermata dal GSR.

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Si elencano la concentrazione più importante, le segnalazioni di individui marcati e in sito inusuale.

22.758 indd. in laguna di Venezia il 26 gennaio (censimenti IW).

In Laguna di Venezia l'11 ottobre, 1 ind. marcato con flags russi e 1 ind. con anello colorato polacco (M. Basso).
4 indd. a San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR), 1.600 m s.l.m., l'8 novembre e 1 ind. il 12 novembre (M. D'Offria, C. Izzo [1]).

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

1 ind. a Boccasette (RO) il 10 maggio (F. Trave [3]).

1 ind. a Porto Baseleghe (VE) il 21 settembre (F. Piccolo, L. Boscain [2][3]).

Croccolone *Gallinago media*

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), tra il 16 e il 28 maggio (A. Mosele, M. & G. Sighele, P. Bertini, G. Dalle Vedove [1]).

Pittima reale *Limosa limosa*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

2.443 indd. in Valle Ca' Zuliani, 1.728 indd. in Valle Ca' Pisani, 255 indd. in Po di Venezia, 58 indd. in Valle Ca' Pasta per un totale di 4.484 indd. nel Delta del Po (RO) il 10 marzo (M. Bovo, M. Veronese, L. Boscain, L. Zanella, L. Stoppa, D. Trombin).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Si elencano la concentrazione più consistente e le segnalazioni in periodo invernale.

13 indd. in Sacca di Scardovari e Bottonera (RO) il 12 gennaio (A. Bocchi, D. Trombin).

1 ind. in Laguna delle Giare (VE) il 21 gennaio (censimenti IW).

1 ind. nelle barene di Canale San Felice (VE) il 7 febbraio (M. Bon, E. Stival, F. Scarton).

25 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 febbraio (L. Bedin, A. Bocchi [3]).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. in risaia a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 30 aprile (A. Mosele, M. & G. Sighele, M. D'Offria, C. Izzo, R. Lerco [1]).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

Si riporta un evento riproduttivo.

Nido con tre uova e presenza di 1 ad. allarmante in una barena artificiale della Laguna Nord di Venezia l'11 aprile (M. Baldin); nessuna ulteriore segnalazione nel mese di maggio.

Si tratta della prima nidificazione accertata per il Veneto di questa specie, del secondo sito italiano di riproduzione e dell'unico sito costiero per il Mediterraneo (SCARTON et al., 2012).

Totano zampegiale minore *Tringa flavipes*

1 ind. ai ripristini Piovini, Valle Millecampi (PD), il 25 giugno (F. Piccolo [3]) (fig. 5).

Qualora fosse confermata dalla Commissione Ornitologica Italiana (COI) si tratterebbe della nona segnalazione italiana e della prima per il Veneto.

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Si elencano la concentrazione più consistente e le segnalazioni in località inusuale.

2 indd. a Montalto, Nogara (VR), il 29 e il 30 marzo e successivamente 1 ind. fino al 5 aprile (E. Cavallini, C. Zanini, M. & G. Sighele et al. [1]).

26 indd. in Valle Ripiego (RO) il 13 agosto (E. Stival).

Voltapietre *Arenaria interpres*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

17 indd. in Sacca di Scardovari e Bottonera (RO) il 12 gennaio (A. Bocchi, D. Trombin).

Oltre 20 indd. in Laguna Sud di Venezia il 4 febbraio (S. Di Carlo, M. Basso et al. [3]).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 30 agosto (A. Bocchi, M. Crivellari).

Dovrebbero essere ora almeno dodici le segnalazioni venete, delle quali otto negli ultimi cinquant'anni e sei in questo secolo; confermata dal GSR.

Stercorariidae**Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus***

2 indd. al largo di Eraclea Mare (VE) il 12 maggio (B. Moretti [3]).

1 ind. al largo di Eraclea Mare (VE) il 23 luglio (G. Sgorlon).

Dovrebbero essere ora almeno quindici le segnalazioni venete degli ultimi cinquant'anni; quelle elencate dovrebbero rappresentare l'ottava e la nona osservazione dal 2004 ad oggi.

Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. tra Cortellazzo ed Eraclea Mare (VE) l'11 aprile (B. Moretti [3]).

1 ind. in Busa Dritta di Pila (RO) il 26 aprile (D. Trombin).

1 ind. a Cortellazzo, Jesolo (VE), il 28 aprile (S. Davison, D. Comin [3]), con altri 2-3 *Stercorarius* sp. non identificati con certezza.

1 ind. presso Barricata (RO) il 6 maggio (L. Boscain).

1 ind. al largo di Boccasette (RO) il 12 maggio (B. Moretti [3]).

2 indd. a Eraclea Mare (VE) il 22 maggio (G. Sgorlon [2][3]).

1 ind. alla diga di San Nicolò, Venezia, il 27 luglio (M.G. Mitri).

1-2 indd. davanti a Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR), il 17 e il 18 settembre (M. Sighele, C. Izzo, R. Lerco, C. Chiappisi, A. Mosele [1]).

1 ad. nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra l'8 e l'11 ottobre (G. Dalle Vedove, E. Stival, M. Sighele et al. [1]).

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

1 ind. a Eraclea Mare (VE) il 26 marzo (G. Sgorlon [3]).

1-2 indd. del 1° calendario davanti a Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR), tra il 10 e il 18 settembre (C. Izzo, R. Lerco, C. Chiappisi, M. & G. Sighele, M. Faccioli et al. [1][3]) (fig. 6).

Sono ora una decina le segnalazioni venete dell'ultimo trentennio, cinque quelle dell'ultimo decennio.

Laridae

Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*

- 1 ind. in Valle Bagliona (RO) il 21 aprile (R. Andreoli, D. Trombin).
1 ind. in Laguna di Caleri (RO) il 17 maggio (L. Boscain, E. Verza, L. Zanella).
5 indd. nella Sacca del Canarin (RO) il 27 maggio (D. Trombin).

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Si elencano segnalazioni di individui marcati.

- 1 ind. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), dall'11 ottobre fino a gennaio 2012, marcato con anello metallico del Museo di Praga (M. Sighele, P. Bertini et al.); lo stesso individuo, inanellato adulto nel luglio 2009 a Staré Město, in Repubblica Ceca, era già stato segnalato nello stesso porticciolo sul Garda nei due inverni precedenti (cfr. SIGHELE et al., 2010 e 2011a).
1 ind. a Pellestrina (VE) il 12 agosto, marcato con anello ungherese "HL97" (M.G. Mitri et al.); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Seghedino, il 15 maggio dello stesso anno (archivio ISPRA).
1 ind. a Chioggia (VE) il 14 novembre, marcato con anello metallico ungherese (M. Basso [2]).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Si elencano la concentrazione più consistente, le segnalazioni di individui marcati, con aberrazione del piumaggio o in sito inusuale.

- 1 ind. in Laguna di Venezia il 14 gennaio, marcato con anello colorato serbo (M. Basso).
A Chioggia (VE) il 14 gennaio 1 ind. marcato con anello colorato ucraino, 1 ind. con anello colorato ungherese e 1 ind. con anello colorato italiano (M. Basso).
1 ind. melanico a Porto Baseleghe (VE) il 12 aprile (L. Boscain).
1 ind. a Eraclea (VE) il 21 maggio, marcato con anello italiano "IVTJ" (E. Stival); era stato inanellato da pullo alle Saline di Cervia (RA) nel luglio 2002 (archivio ISPRA).
1 ind. in Valle Grassabò (VE) il 28 giugno, marcato con anello italiano "ISHL" (G. Sgorlon [3]); era stato inanellato da pullo a Comacchio (FE) nel luglio 2009, osservato in Spagna nel gennaio 2011 (archivio ISPRA).
1 ind. alla Palude del Busatello (VR) il 30 giugno (F. Novelli [1]).
3.220 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 30 agosto (R. Andreoli, D. Trombin).
1 ind. a Pellestrina (VE) il 24 settembre, marcato con anello colorato greco (R. Faè).
In Laguna di Venezia il 6 ottobre, 1 ind. marcato con anello colorato tedesco e 1 ind. con anello colorato italiano (M. Basso).

Gavina *Larus canus*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

- 1 ad. sullo scanno della Sacca del Canarin (RO) l'1 luglio (L. Boscain).

Zafferano *Larus fuscus*

- 1 ind. alla cava Bandie di Lovadina (TV) il 12 marzo (L. Boscain).
2 add. presso Bacino Villa a Caorle (VE) il 17 marzo (L. Boscain).
1 ind. alla foce del Tagliamento (VE) l'11 aprile (B. Moretti [3]).
1 ind. a Campalto (VE) il 9 agosto (E. Stival [3]), forse lo stesso individuo già segnalato in questo sito anche in passato (cfr. SIGHELE et al., 2010).
1 ind. alla foce del Po di Pila (RO) l'11 settembre (L. Boscain, S. Davison, P. Vacilotto, E. Verza).
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 13 novembre (R. Maistri [4]).
1-3 indd. a Verona tra il 20 dicembre e gennaio 2012 (P. Bertini, M. Sighele, R. Lerco, C. Zanini et al. [1]).
1 ind. a Chioggia (VE) il 22 dicembre (F. Piccolo [2]).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Si riporta il conteggio più importante.

19 indd. in Laguna Sud di Venezia il 21 gennaio (censimenti IW).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Si elencano solo le segnalazioni in periodo inusuale o che non si riferiscono a individui isolati.

8 indd. in Laguna Sud di Venezia il 4 febbraio (S. Di Carlo, M. Basso et al. [3]).

1-3 indd. all'Ecocentro di Chioggia (VE) il 22 marzo (L. Boscain, A. Soraruf).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 23 maggio (G. Sgorlon – MORUS, 2012).

1 ind. del 3° calendario a Porto Baseleghe (VE) il 23 luglio (L. Boscain, E. Stival).

1 ind. all'Ecocentro di Chioggia (VE) il 7 settembre (L. Boscain).

Almeno 2 indd. a Verona tra il 26 novembre e il 23 dicembre (M. Sighele, R. Lerco [1]).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. in Sacca Cavallari, foce del Po di Maistra (RO), l'11 gennaio (L. Boscain, R. Giubilato [3]).

1 ind. in Laguna Vallona (RO) l'1 febbraio (D. Trombin [3]).

1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR), il 25 febbraio (P. Bertini [1]).

Sternidae**Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica***

Si elencano segnalazioni relative alla riproduzione o in sito inusuale.

Si segnala un ulteriore aumento della popolazione nidificante nel Delta del Po (RO), per la presenza nelle valli Canocchione e Moraro di circa 500 cpp. (E. Verza, D. Trombin et al.), quindi una stima doppia rispetto all'anno precedente (SIGHELE et al, 2011a).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 23 luglio (F. Zanatta [4]).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Si riporta il conteggio più importante.

34 indd. in Valle S. Carlo, 28 indd. in Valle Ca' Zuliani e 2 indd. in Valle Canocchione (RO) il 30 agosto (R. Andreoli, D. Trombin, L. Bedin, E. Verza).

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale.

1 ind. del 1° calendario tra Lido Ronchi e Lazise (VR) tra il 6 e il 26 dicembre (A. Mosele, M. D'Offria, M. Faccioli et al. [1]).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

5 indd. a Ca' Cornera e 2 indd. all'isola Tontola di Ficarolo (RO) il 28 aprile (D. Trombin, E. Verza, L. Zanella).

2-3 indd. sul Lago di Garda tra Peschiera d/G e Pacengo (VR) tra il 28 aprile e il 2 maggio (P. Bertini, R. Lerco, C. Izzo, M. D'Offria, A. Pigozzo et al. [1]).

1 ind. in Valle Paliaga (VE) il 30 aprile (E. Stival, A. Bossi [2][3]).

2-5 indd. in Valle Ghebo Storto (PD) tra il 30 aprile e l'1 maggio (A. Lucchetta, L. Sattin [4]).

3-5 indd. in Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l'1 e il 10 maggio (L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo, F. Trave [2][3]), successivamente 2 indd. il 4 giugno (G. Sgorlon).

1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 3 maggio (A. Bossi [4]).

1 ind. nei pressi di Capovilla, Caldogno (VI), il 5 maggio (L. Ilahiane [4]).

1 ind. a Bacucco (RO) l'11 maggio (F. Simonazzi [4]).
2 indd. nei pressi di Ca' Pasqua (PD) il 6 giugno (A. Tonelli [4]).

Beccapesci *Sterna sandvicensis*

Si elencano segnalazioni di individui marcati.

1 ind. a Chioggia (VE) l'8 settembre, marcato con anello francese (M. Basso).
1 ind. a Pellestrina (VE) il 24 settembre, marcato con anello francese (R. Faè).
1 ind. in Laguna di Venezia il 6 ottobre, marcato con anello italiano (M. Basso).

Sterna codalunga* *Sterna paradisaea

1 ind. del 1° calendario a Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR), tra il 29 settembre e il 16 ottobre (C. Zanini, M. & G. Sighele, R. Lerco et al.) (fig. 7).

Dovrebbe trattarsi della diciassettesima segnalazione italiana e della terza per il Veneto, la prima in provincia di Verona (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899; BRICHETTI & FRACASSO, 2006); confermata dal GSR.

Columbiformes

Columbidae

Colombella *Columba oenas*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e segnalazione in località inusuale.

107 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) il 2 febbraio (G. Sgorlon [3]).
50 indd. alla Tenuta Civrana (VE) il 7 febbraio (A. Tonelli).
26 indd. a San Martino di Venezze (RO) il 6 dicembre (A. Bombonato).

Psittaciformes

Psittacidae

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

Si elencano la concentrazione più consistente e nuove località.

1 ind. ad Adria (RO) il 10 febbraio (D. Trombin).
1 ind. nella garzaia di Villanova Marchesana (RO) il 29 marzo (D. Trombin).
2 indd. sul Brenta tra Noventa Padovana (PD) e Strà (VE), il 7 luglio (F. Caravello [4]).
75 indd. a Villa Bartolomea (VR) il 4 e il 7 agosto (A. Berardo [1]).

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 maggio (F. Piccolo) (fig. 8).
1 ind. in Valle Passarella (RO) l'11 maggio (D. Trombin [3]).
Probabile nuova nidificazione nel Padovano con l'osservazione di 1 juv. a Ca' di Mezzo, Codevigo (PD), il 18 giugno (S. Barison [2][3]).
Probabile nuova nidificazione nel Delta del Po (RO) con l'osservazione di 1 juv. a Bottrighe di Adria il 6 luglio (D. Trombin).
1 ind. ad Annone Veneto (VE) il 17 settembre (A. Lippi [2]).

Strigiformes

Strigidae

Civetta nana *Glaucidium passerinum*

Si segnala una località inusuale.

2 indd. sul Monte Grappa (TV) il 22 giugno (G. Silveri [3]).

Allocco degli Urali *Strix uralensis*

1 ind. in canto nella Foresta del Cansiglio nel comune di Farra d'Alpago (BL) il 7 aprile (F. Mezzavilla [4]).

1 ind. in canto nella Foresta del Cansiglio nel comune di Tambre (BL) l'1 ottobre (G. Silveri et al. [3]) e 1 ind. osservato in volo il 12 ottobre (L. Boscain, P. Vacilotto [3]).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. a Valle Grassabò (VE) il 14 febbraio (A. Bossi).

1 ind. a Treviso il 30 marzo (R. Storer [3]).

1 ind. a Monastier (TV) il 28 aprile (P. Vacilotto [3]).

1 ind. in Valle San Carlo (RO) il 6 maggio (D. Trombin).

2 indd. a Passarella di Sopra, San Dona' di Piave (TV) il 22 novembre (A. Nardo).

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Si segnala una nidificazione piuttosto tardiva.

1 nido con 3 pulli a Campotorondo (BL) il 9 agosto (G. de Nadai, F. Mezzavilla).

Apodiformes

Apodidae

Rondone pallido *Apus pallidus*

Almeno 1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 24 luglio (C. Izzo, C. Chiappisi [1]).

Almeno 6 indd. al Vajo della Marciora (VR) il 13 agosto (R. Lerco [1]).

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 18 maggio (G. Silveri).

1 ind. a Jesolo (VE) il 22 maggio (S. Tasca [4]).

2 (forse 3) cpp. hanno nidificato ai confini meridionali dei comuni di Legnago e Villa Bartolomea (VR), presenti almeno tra il 23 maggio e l'8 settembre (P. Bertini, A. Berardo, G. Rigo et al. [1]).

1 ind. a Ca' Cappellino (RO) l'1 giugno (N. Donà).

1 nido attivo a Ca' Cornera (RO) il 9 giugno, con pulli vocianti il 9 luglio (L. Boscain).

1 ind. a Villaregia (RO) il 13 giugno (L. Sattin, R. Giubilato, A. Lucchetta).

Piciformes**Picidae****Picchio nero *Dryocopus martius***

Si elencano osservazioni in pianura.

1 ind. nell'Oasi Cave di Gaggio Nord di Marcon (VE) il 30 gennaio, il 27 febbraio e il 18 marzo (L. Busatto, A. Lucchetta, M. Scalabrin [2][3]), dove era stato segnalato anche nel dicembre 2010 (cfr. SIGHELE et al., 2011a).

2 ind. a San Michele Vecchio, Quarto d'Altino (VE), il 4 marzo (C. Fassina [2]).

2 ind. nell'Oasi Cave di Gaggio Nord di Marcon (VE) il 19 dicembre (L. Busatto, M. Scalabrin).

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

La specie si sta confermando piuttosto diffusa in provincia di Belluno, sporadica altrove.

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 gennaio (R. Corsi [3]).

Oltre alla segnalazione di 1 ind. al Lago di Busche (BL) l'8 gennaio (M. Zenatello [4]), la specie è stata osservata in almeno altre 18 occasioni tra marzo e luglio nella bassa Valbelluna fra il Torrente Cison e Ponte nelle Alpi (BL), con nidificazioni accertate, per la presenza di giovani da poco involati, al Vincheto di Celarda e nel comune di Fonzaio (M. Zenatello, M. Varaschin, N. Barp, G. de Nadai, M. Cassol, S. De Col, G. Tormen). Inoltre 1 ind. è stato contattato lungo il Torrente Cordevole nei pressi di San Gottardo, Sedico (BL), il 15 agosto (G. Silveri [4]).

1 ind. in golena di Panarella di Papozze (RO) il 17 febbraio, ancora presente il 29 marzo (D. Trombin).

1 ind. in Valdadige nei pressi di Ceraino (VR) il 24 marzo (T. Campedelli).

Picchio tridattilo *Picoides tridactylus*

2 ind. sul versante est del Monte Zovo, Auronzo di Cadore (BL), 1.580 m s.l.m. il 4 luglio (K. Bettiol, L. Bonato).

1 ind. al Coston Sommo, Monte Spina - Comelico (BL), 1.700 m s.l.m. il 6 luglio (K. Bettiol, L. Bonato).

Passeriformes**Laniidae****Averla cenerina *Lanius minor***

Specie migratrice e nidificante regolare, ma molto scarsa e con distribuzione frammentata.

Non sono note nidificazioni certe durante l'anno.

1 ind. a Ca' Emo (RO) il 12 giugno (D. Trombin).

1 ind. a Corrubbioli (VR) il 18 giugno (R. Lercio [1]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 21 luglio (G. Silveri).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. in Valle Ripiego (RO) il 21 aprile (L. Boscain, G. Fornasa).

1 ind. a Ca' Mello (RO) il 20 maggio (D. Trombin, L. Zanella).

Corvidae**Corvo comune *Corvus frugilegus***

1 ind. a Verona il 15 gennaio (C. Izzo [1]).

20 ind. a Pampuro, Sorgà (VR) il 26 gennaio (F. Novelli [1]).

- 12 indd. a Moriago della Battaglia (TV) il 31 gennaio (G. Silveri [3]).
 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 2 febbraio e il 6 marzo, 2 indd. il 9 marzo (G. Sgorlon, A. Nardo, F. Piccolo, F. Trave [2][3]).
 1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) dal 21 al 25 febbraio (A. Tonelli).
 1 ind. a Montalto, Nogara (VR), il 26 marzo (C. Izzo, M. Allen [1]).
 1 ind. a Favaro Veneto (VE) il 13 aprile (E. Stival [2][3]).
 1 ind. a Magera di Oderzo (TV) il 21 aprile (G. Sgorlon [2][3]).
 2 indd. a Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), il 15 ottobre (D. Fasano, K. Battiston [2]).
 1 ind. a Oderzo (TV) il 22 ottobre (G. Sgorlon).
 1 ind. nei pressi di Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR), il 13 novembre (P. Bertini et al. [1]).
 6 indd. a Origo di Pederobba (TV) il 26 dicembre (G. Silveri [3]).

Cornacchia nera *Corvus corone*

Si elencano segnalazioni in pianura in periodi inusuali.

- 1 ind. a Portogruaro (VE) osservato tutto l'anno in ambiente urbano (D. Fasano [2]).
 1 ind. a Ponte di Piave (TV) il 26 e il 27 aprile (G. Sgorlon [2]).
 1 ind. a Treviso il 26 aprile (G. Sgorlon [2]).
 2 indd. a Gazzera, Venezia, il 13 maggio (E. Stival [2]).
 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 19 maggio (K. Battiston, D. Fasano [2]).
 1 ind. nell'Oasi Cave di Gaggio Nord di Marcon (VE) il 21 maggio (E. Stival, A. Bossi).

Cornacchia grigia *Corvus cornix*

Si riporta la concentrazione più consistente.

- 5.884 indd. all'Isola dei Morti, Sernaglia della Battaglia (TV), il 22 gennaio (F. Mezzavilla, G. Martignago).

Corvo imperiale *Corvus corax*

Si riporta una segnalazione in località inusuale.

- 2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 10 aprile (G. Piras).

Panuridae

Basettino *Panurus biarmicus*

Specie che soffre di una importante contrazione di presenze e di siti adatti alla nidificazione, per cui oggi è molto scarsa e localizzata, probabilmente nidificante in regione solo a Valle Vecchia di Caorle (VE) e alla Palude del Busatello (VR); si elencano le segnalazioni al di fuori di queste due località, possibilmente riferibili anche ad individui migranti/svernanti provenienti da fuori regione (estero compreso).

- 2 indd. a Pederobba (TV) il 22 gennaio (G. Silveri [4]).
 1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 10 marzo e 2 indd. il 26 marzo (L. Boscain, D. Trombin, E. Verza, L. Zanella).
 2 indd. a Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR), tra il 14 ottobre e il 2 gennaio 2012 (S. Mazzotti, D. Bernasconi, M. Faccioli et al. [1]).

Alaudidae

Calandra *Melanocorypha calandra*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 23 aprile (M. Stenico, M. Nordio).

Dovrebbe trattarsi della settima segnalazione per il Veneto degli ultimi 25 anni.

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Si elencano segnalazioni al di fuori dei noti siti riproduttivi delle zone delle risaie veronesi.

3-5 ind. in volo canoro a Zerpa, Arcole (VR), tra il 10 e il 19 aprile (R. Pistollato, M. Pesente [1]).

1 ind. nei pressi di Barricata (RO) il 19 aprile (D. Trombin).

Calandrina *Calandrella rufescens*

1 ind. catturato e rilasciato alla Bonifica di Loncon (VE) il 26 ottobre (G. Zogno).

Dovrebbe trattarsi della terza segnalazione per il Veneto, l'unica degli ultimi cinquant'anni (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899; ALIPPI, 1919).

Tottavilla *Lullula arborea*

Si riporta una segnalazione al di fuori della Lessinia (VR), l'unica area regionale di presenza consistente e regolare sia in periodo riproduttivo che invernale.

1 ind. in transito sul Monte Pizzoc (TV) il 29 ottobre (L. Boscain [3]).

Hirundinidae

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 5 maggio (G. Sgorlon [2]).

1 ind. a Ca' Zane (VE) il 30 maggio (M. Bon, E. Stival [2][3]).

Phylloscopidae

Luì forestiero *Phylloscopus inornatus*

1 ind. a Ca' Venier (RO) il 22 novembre (M. Chillon, L. Boscain, L. Bedin, L. Zanella, M. Crivellari, D. Trombin) (fig. 9).

Dovrebbe trattarsi della terza segnalazione per il Veneto, le due precedenti in provincia di Vicenza (Brichetti & Fracasso, 2010); confermata dal GSR.

Luì di Hume *Phylloscopus humei*

1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) tra il 19 e il 21 novembre (L. Sattin) (fig. 10).

Sono una dozzina le segnalazioni italiane e questa è la seconda osservazione per il Veneto dopo quella dell'inverno 2009-2010 al Lido di Venezia (SIGHELE et al., 2010 e 2011a); confermata dal GSR.

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

Si elencano le segnalazioni relative alla ssp. *tristis* (Lui siberiano).

- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR) il 23 gennaio (F. Novelli [1]).
- 1 ind. a Palude Pellegrina il 12 marzo (M. Sighele, M. Allen, C. Izzo [1]).
- 1 ind. inanellato alle Cave di Marcon (VE) il 15 marzo (A. Lucchetta).
- 1-3 ind. alla Palude del Busatello (VR) tra il 19 marzo e il 3 aprile (M. Pesente, P. Maragna, F. Novelli [1]).
- 1 ind. a Spresiano (TV) il 23 dicembre (L. Boscain [3]).
- 1 ind. a Loncon (VE) il 29 dicembre (L. Boscain [3]).

Sylviidae**Sterpazzolina comune *Sylvia cantillans***

Specie migratrice regolare, ma poco numerosa, si elencano tutte le osservazioni note.

- 1 ind. a Cimadolmo (TV) il 5 aprile (F. Zanatta [4]).
- 1 ind. a Donada (RO) il 3 giugno (L. Boscain).

Locustellidae**Forapaglie macchiettato *Locustella naevia***

Specie migratrice regolare, ma scarsa, si elencano tutte le osservazioni note.

- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR) il 20 marzo (M. Pesente, F. Novelli [1]).
- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR) il 22 aprile (F. Novelli [1]).
- 1 ind. catturato e rilasciato in Valle Ghebo Storto (PD) il 30 aprile e il 1° maggio (L. Sattin et al.).

Acrocephalidae**Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon***

Specie migratrice regolare, assai scarsa nei mesi invernali, periodo a cui si riferisce la segnalazione riportata.

- 1 ind. alla Palude di Cona (VE) il 14 dicembre (F. Tatino [4]).

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Si elencano segnalazioni in periodo di nidificazione, peraltro senza conferme di eventi riproduttivi (la migrazione pre-nuziale in questa specie risulta comunque particolarmente protratta).

- 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 4 giugno (G. Sgorlon).
- 1 ind. in canto sullo scanno di Boccasette (RO) il 10 giugno (L. Boscain).

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

1 ind. a Montebelluna (TV) almeno tra il 2 e il 20 gennaio (T. Tesser, G. Silveri, F. Zanatta [2][3]).

2 ind. a Pederobba (TV) tra il 7 e il 20 gennaio (V. Binotto, G. Silveri, G. Martignago, G. Morao, L. Fabbriolini [2][3]).

Certhidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Nei primi mesi dell'anno è stata segnalata una irruzione in pianura nel Veneto orientale.

1 ind. a Stra (VE) il 4 gennaio (L. Sattin [2]).

1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 6 gennaio (L. Panzarin).

3 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 gennaio (F. Piccolo, P. Vacilotto et al. [3]).

1 ind. a Ca' Sabbioni (VE) l'8 gennaio (E. Stival [2][3]).

1 ind. alle sorgenti dello Storga, Treviso, il 15 gennaio (L. Boscain).

1 ind. a Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), il 16 gennaio (L. Boscain).

1 ind. nell'Oasi Cave di Gaggio Nord di Marcon (VE) tra il 18 e il 27 febbraio (M. Scalabrin, L. Busatto, M. Chillon [2]).

1 ind. a Valle Morosina (PD) il 19 febbraio (L. Sattin).

1 ind. a Cessalto (TV) il 6 marzo (A. Piazza [2]).

Troglodytidae

Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Si riporta una segnalazione inusuale per sito e località.

1 cp. nidificante in una stalla nei pressi della Palude di Onara (PD) tra fine luglio e i primi di agosto (S. Bertollo).

Muscicapidae

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) l'8 dicembre (G. Sgorlon [2][3]).

10 ind. ca. ai piedi del Monte Baldo (VR), 1.350 m s.l.m., il 31 dicembre (M. Ovatoli [1]).

Pettiroso *Erithacus rubecula*

Si riporta una segnalazione inusuale per località e periodo.

1 ind. a Mestre (VE) nel mese di maggio (A. Sartori, A. Molinari).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 settembre (L. Boscain).

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*

Si riporta una segnalazione inusuale per località e periodo.

1 ind. a Mestre (VE) il 18 maggio e in seguito recuperato 1 juv. non volante il 15 giugno (A. Sartori, L. Panzarin).

Prunellidae**Sordone *Prunella collaris***

Si elencano segnalazioni in siti inusuali a bassa quota.

2 indd. a Stallavena, Grezzana (VR), il 5 febbraio (C. Izzo, U. Monicelli, R. Lerco, M. Sighele [1]).

3 indd. a Lumignano, Colli Berici (VI), il 23 dicembre (M. Nordio [3]).

Passeridae**Passera europea *Passer domesticus***

Si riporta una segnalazione in un sito inusuale.

2 indd. a Oderzo (TV) tra il 30 gennaio e l'1 febbraio (G. Sgorlon [2][3]).

Motacillidae**Cutrettola *Motacilla flava***

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. a Campolevè, Lessinia (VR), 1.500 m s.l.m., il 21 maggio (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen [1]).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 17 settembre (L. Boscain).

Fringillidae**Venturone alpino *Carduelis citrinella***

Oltre 30 indd. nella zona della Croda da Lago (BL) il 28 agosto (R. Storer [4]).

Organetto *Carduelis flammea*

Si riporta un'osservazione in località inusuale.

5 indd. a Bocchetta della Vallina, Lessinia (VR), il 3 aprile (M. Sighele [1]).

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Fino a 18 indd. al tradizionale sito di Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), dal 20 dicembre 2010 fino al 19 febbraio (M. Dall'O, P. Parricelli, M. Sighele, G. Perlato et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

1 ind. a Lido San Nicolò (VE) il 19 gennaio (M.G. Mitri, S. Castelli, A. Sartori [3]).

20 indd. ca. sul Monte Cesen (TV) il 9 febbraio (E. Vettorazzo [4]).

3 indd. a Moriago della Battaglia (TV) il 25 febbraio (G. Silveri [3]).

5 indd. a Mazzolada di Portogruaro (VE) l'1 marzo (G. Sgorlon [2][3]).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

1-7 indd. a Maserada del Piave (TV) almeno tra il 5 novembre 2010 e il 18 febbraio (L. Boscain, G. Silveri, V. Binotto, P. Vacilotto et al. [3] - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

2 indd. tra l'area del Settolo Basso e la garzaia di Pederobba (TV) in gennaio (G. Silveri).

1 m. a Maserada sul Piave (TV) almeno il 6 novembre e il 2 dicembre, 1 f. il 6 e il 17 dicembre (P. Vacilotto, G. Sgorlon, L. Boscain, F. Zanatta et al. [3]).

Zigolo minore *Emberiza pusilla*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 6 e il 17 marzo (G. Piras, C. Fassina et al. [3]).

Poche le segnalazioni in Veneto dell'ultimo cinquantennio, questa dovrebbe essere la seconda del secolo; confermata dal GSR.

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. a Valle Zignago (VE) il 24 gennaio (M. Azzolini et al. [3]).

2 indd. ad Albarella (RO) il 5 luglio (F. Bricolo [3]).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

9 indd. in Valle Franchetti (VE) il 24 gennaio (censimenti IW).

1 ind. a Lazise (VR) l'8 marzo (C. Chiappisi).

2 indd. nei pressi di Borghetto, Valeggio sul Mincio (VR), il 19 marzo e successivamente 1 ind. tra il 14 e il 25 giugno (G. Dalle Vedove, M. Sighele, L. Veronesi et al.).

1 ind. a Caldogno (VI) l'11 aprile (A. Alberi [3]).

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 3 maggio (M. Sighele et al. [1]).

1 indd. in Valle Ca' Mello (RO) il 31 maggio (N. Donà).

2 indd. in Valle Ca' Pasta (RO) tra il 13 e il 27 dicembre (M. Crivellari, D. Sartori, M. Veronese, C. Malavasi).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 cp. nel Collettore Padano a sud di Adria (RO) il 14 aprile (D. Trombin, N. Donà).

1 cp. nel Canalbianco ad Adria (RO) il 4 giugno (D. Trombin).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 m. sul basso Piave (VE) il 24 gennaio (censimenti IW).

1 m. a Cavaso del Tomba (BL) il 5 marzo (G. Silveri).

1 m. al Lago di Busche (BL) tra il 26 marzo e il 17 aprile (N. Barp, M.E. Bibelia, G. de Nadai).

1 f. ad Albarella (RO) il 9 luglio (F. Bricolo [3]).

1 m. a Treviso il 27 dicembre (G. Sgorlon).

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*

1 m. a Pescantina (VR) il 15 e il 16 gennaio (V. Fanelli, A. Pigozzo, M. Sighele [1]); probabilmente lo stesso individuo era stato osservato nello stesso sito anche il 23 gennaio 2010 (V. Fanelli, A. Pigozzo [1]).

Smergo dal cappuccio *Lophodytes cucullatus*

1 f. al Lago di Busche (BL) almeno dal 19 novembre a marzo 2012 (N. Barp, M.E. Bibelia, M. Zenatello, M. Villa et al. [4]).

Colino della Virginia *Colinus virginianus*

1 ind. a Ca' Zen di Taglio di Po (RO) il 25 maggio (M. Belardi).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

Un progetto dell'Istituto di ricerche Konrad Lorenz di Grünau (Austria) si prefigge di indurre un gruppo di individui a svernare in Toscana.

2 indd. nei pressi di Trecenta (RO) tra il 4 e il 6 giugno (C. Malavasi, N. Masieri et al.).

3-4 indd. tra Ponzano Veneto, Spresiano e Cimadolmo (TV) tra il 14 luglio e il 14 agosto (G.C. Lorenzon, F. Zanatta, L. Boscain, G. Silveri [3][4]); in seguito 4-5 indd. tra Cavaso del Tomba e Pederobba (TV) tra l'1 e il 9 settembre (V. Binotto, G. Silveri et al. [3]) e ancora 1 ind. a Valdobbiadene (TV) il 23 settembre (G. Silveri [3]).

1 ind. nei pressi di Valeggio sul Mincio (VR) il 29 luglio (G. Darra [1]).

4 indd. tra Jesolo ed Eraclea (VE) il 4 settembre (A. Nardo [2]).

1 ind. a Ca' Vendramin (RO) il 15 settembre (E. Merli [4]).

Gru coronata *Balearica regulorum*

Si conferma la presenza, già segnalata da diversi anni, di 1 ind. alla Palude del Busatello (VR) anche per tutto il 2011 (F. Novelli, M. Sighele et al. [1] - cfr. BON et al., 2008; SIGHELE et al., 2009, 2010, 2011a).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. a Villorba (TV) il 10 giugno (F. Zanatta [4]).

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*

1 ind. a Ca' Emo (RO) il 27 marzo (D. Trombin).

1 ind. a Oderzo (TV) il 2 settembre (G. Sgorlon).

1 ind. a Villadose (RO) l'8 novembre (E. Verza).

Ararauna *Ara ararauna*

1 ind. all'uscita autostradale Padova est l'11 settembre (M. Nordio [2]).

1 ind. a Catena di Villorba (TV) tra fine settembre e i primi di ottobre per circa una settimana (P. Vacilotto et al. [3]).

Amazzone fronteggiata *Amazona ochrocephala*

1-2 ind. tra Villorba e Povegliano (TV) tra il 27 dicembre 2010 e il 2 gennaio (F. Zanatta - cfr. SIGHELE et al., 2011a).

Tucano toco *Ramphastos toco*

1 ind. nelle dune di Donada (RO) nel mese di luglio (fide E. Verza).

Cardinale rosso *Cardinalis cardinalis*

1 ind. nei pressi di Agana, Fonzaso (BL), il 19 marzo (M. Zenatello, L. Lasen).

APPENDICE

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 m. alle Cave di Salzano (VE) l'11 aprile 2010 (M. Semenzato).

Beccaccia *Scolopax rusticola*

Nidificazione ad Alberoni (VE) nella primavera del 2005 quando un pullo è stato fotografato nell'area di pineta al confine del Golf Club Alberoni. Nella primavera del 2006 è stato osservato 1 ad., ma in seguito non è stata accertata una nuova nidificazione (P. Perlasca, M. Pulliero).

Cornacchia nera *Corvus corone*

Si riporta una segnalazione in pianura in periodo inusuale.

1 ind. a Zelarino, Mestre (VE), il 2 maggio 2010 (M. Semenzato).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e birdwatcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito di questo lavoro. Un particolare ringraziamento a Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton e Marco Zenatello per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- ALIPPI N., 1919. Gli uccelli di comparsa accidentale in Italia e il loro valore per lo studio delle migrazioni. *Riv. ital. Orn.*, 5: 31-65.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899. Uccelli rari o più difficili da aversi conservati nella sua collezione ornitologica italiana al 31 dicembre 1898. *Ornis*, 9: 199-249.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929. Ornitologia italiana. *Hoeppli Ed.*: pp. 1046.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (RED.), 2008. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 59: 129-151.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2006. Ornitologia italiana. Vol. 3. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna, 438 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2010. Ornitologia Italiana. Vol. 6. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna,, 494 pp.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F., 2011. Checklist degli Uccelli del Veneto (maggio 2010). In: Bon M., Mezzavilla F., Scarton F. (eds.), Atti 6° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, suppl. al vol. 61, 103-117.
- GARGIONI A., 2011. La migrazione post riproduttiva dei rapaci nel Parco del Mincio (colline moreniche del Lago di Garda MN, BS, VR). *Infomigrans*, 28: 12.
- MASSA R. (a cura di), 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.
- MEZZAVILLA F., MARTIGNAGO G., PICCOLO F., SILVERI G., SALVINI F., 2011. Migrazione autunnale dei rapaci sopra le Prealpi Trevigiane - 2011. *Infomigrans*, 28: 13.
- MORUS, 2012. Bollettino 2/2011. *Morus - Progetto Uccelli Marini*, 6: 29 pp.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., 2010. Taxonomic recommendations for British birds: Sixth Report. *Ibis*, 152: 180-186.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., VOTIER S.C., 2011. Taxonomic recommendations for British birds: Seventh Report. *Ibis*, 153: 883-992.
- SCARTON F., BALDIN M., VALLE R., 2012. A new Mediterranean breeding site for the Eurasian Curlew, in Italy. *British Birds* 105: 154-155.
- SGORLON G., 2008. Il Falco cuculo (*Falco vespertinus*) nidifica in Veneto. Aggiornamento sullo status della specie nel Veneto orientale. *Quaderni di Birdwatching*, 20.
- SEMENZATO M., SCARTON F., 1998. Interessanti reperti conservati nella collezione "Americo Giol" di Oderzo (Treviso). *Riv. ital. Orn.*, 68 (2): 189.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 60: 143-168.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2010. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2009. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 61: 83-115.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2011a. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 62: 181-218.
- SIGHELE M., LERCO R., IZZO C., 2011b. Alcuni dati sulla migrazione post riproduttiva dei rapaci a Verona. *Infomigrans*, 28: 11.
- VIOLANI C., BARBAGLI F., 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - Parte prima: Struthioniformes - Psittaciformes. *Avocetta*, 30 (num. sp.): 5-65.

Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list e dei siti web consultati sono:
 Verona BW: www.veronabirdwatching.org
 Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw
 EBN Italia: www.ebnitalia.it
 Ornitho: www.ornitho.it



Fig. 1. Cigno minore (*Cygnus colombianus*), Valle Morosina (PD). Foto di L. Sattin.



Fig. 2. Oca lombardella (*Anser albifrons*), Valle Zignago (VE). Foto di A. Tonelli.




Fig. 3. Moretta codona (*Clangula hyemalis*), Laghetto del Frassino (VR). Foto di R. Lerco.



Fig. 4. Falco della Regina (*Falco eleonorae*), Colle San Giorgio, Colli Asolani (TV). Foto di F. Piccolo.



Fig. 5. Totano zampegialle minore (*Tringa flavipes*), Valle Millecampi (PD). Foto di F. Piccolo.




Fig. 6. Labbo codalunga (*Stercorarius longicaudus*), Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR). Foto di G. Sighele.



Fig. 7. *Sterna codalunga* (*Sterna paradisaea*), Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR). Foto di M. Sighele.



Fig. 8. Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*), Valle Vecchia di Caorle (VE). Foto di F. Piccolo.



Fig. 9. Lui forestiero (*Phylloscopus inornatus*), Ca' Venier (RO). Foto di M. Crivellari.



Fig. 10. Lui di Hume (*Phylloscopus humei*), Valle Ghebo Storto (PD). Foto di L. Sattin.