

Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2013

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2013 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le segnalazioni di specie rare come cigno selvatico, oca collarossa, gobbo della Giamaica, airone schistaceo, capovaccaio, grifone, falco della Regina, sacro, gallina prataiola, labbo codalunga, gabbiano tridattilo, lui forestiero, calandro maggiore e ciuffolotto scarlatto; lo svernamento di occhione e zigolo golarossa; le prime informazioni sulla riproduzione del rondone pallido e la conferma della nidificazione di fenicottero, falco cuculo, cuculo dal ciuffo, ghiandaia marina e picchio rosso minore.

Summary. *Ornithological report for the year 2013 in the Veneto region (NE Italy).*

Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematic order. The most interesting data include sightings of rare species like the Whooper Swan, Red-breasted Goose, Ruddy Duck, Western Reef Heron, Egyptian Vulture, Griffon Vulture, Eleonora's Falcon, Saker Falcon, Little Bustard, Long-tailed Skua, Kittiwake, Richard's Pipit and Common Rosefinch; wintering of Stone-curlew and Pine Bunting; first breeding data of Pallid Swift and new breeding data of Greater Flamingo, Red-footed Falcon, Great Spotted Cuckoo, Roller and Lesser Spotted Woodpecker.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2013 relative a 158 specie di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 12 specie alloctone e/o fuggite da cattività, oltre ad alcuni soggetti ibridi. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione. Per le specie poco frequenti a livello nazionale, qualora disponibile, è stato inserito anche il parere favorevole del Gruppo di validazione delle Specie Rare (GSR) che verifica le segnalazioni inserite nel data base ornitho.it.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali è già stata resa pubblica nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia BW; [3] Deltapobw; [4] EBN Italia; [5] ornitho.it; [6] migration.net. Con "censimenti IW" si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.

In conformità con scelte analoghe, la sequenza e la tassonomia seguono la check list degli uccelli italiani per i non-Passeriformi (FRACASSO et al., 2009) mentre si è tenuto conto delle nuove acquisizioni sistematiche per quanto concerne i Passeriformi come nel caso della check-list veneta degli uccelli (SANGSTER et al., 2010, 2011; FRACASSO et al., 2011). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a VIOLANI & BARBAGLI (2006) e MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes**Anatidae****Cigno reale *Cygnus olor***

Si elencano individui marcati.

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 marzo, a Ca' Savio (VE) il 9 giugno, a Caorle (VE) l'11 giugno, con collare "IBSH" (E. Stival, L. Facco, D. Scheffler) applicato alla foce dell'Isonzo (GO) nel luglio 2007; in seguito è stato osservato frequentemente a Valle Vecchia dal gennaio 2008 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2013).

1 ind. in cova a Ceggia (VE) il 21 giugno e in seguito il 6 agosto e il 2 novembre, marcato con collare italiano "ICAJ" (G. Sgorlon) applicato alla foce dell'Isonzo (GO) nell'agosto 2008: in seguito è stato osservato frequentemente tra San Donà di Piave, Cessalto e Ceggia (TV) dal maggio 2009 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2011, 2013).

1 ind. con pulli a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 28 giugno con collare "IBCF" (G. Sgorlon) applicato alla foce dell'Isonzo (GO) nell'agosto 2006; in seguito è stato osservato frequentemente a Valle Vecchia dal marzo 2007 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2013).

Cigno nero *Cygnus atratus*

3 indd. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (L. Panzarin).

9 indd. in Valle Perera (VE) il 14 gennaio, con 1 cp. con 4 pulli (S. De Col, G. Tormen).

1 ind. in Valle Morosina (PD) il 16 gennaio (M. Basso, A. Sartori).

2 indd. a Porto Levante (RO) il 16 febbraio e 1 ind. il 17 febbraio (E. Tessarin, A. Tonelli [5]), verosimilmente aufughi.

2 indd. in Valle Pierimpiè (PD) il 23 febbraio (L. Boscain [5]).

3 indd. al laghetto di Altavilla Vicentina (VI) il 2 marzo, ancora 3 indd. di cui 1 in cova il 25 luglio, 4 indd. il 30 dicembre (M. Cargasacchi, E. Stival, M. Fabrello, G. Piras [5]), verosimilmente introdotti.

1 ind. in Laguna Nord di Venezia tra il parco San Giuliano a Mestre, Campalto e la Palude di Cona (VE) tra il 9 marzo e il 5 settembre, ma 3 indd. il 17 luglio (A. Bossi, C. Sent, R. Storer, E. Stival et al. [2] [5]).

1 ind. a Treviso il 10 marzo (A. Bossi [5]).

4 indd. in Valle Morosina (PD) il 21 novembre (L. Sattin [5]).

Cigno selvatico *Cygnus cygnus*

1 ind. in Valle Morosina (PD) tra il 17 e il 23 febbraio (L. Sattin et al.).

L'ultima segnalazione in Veneto risale al 2003 (BON et al., 2004); confermata dal GSR.

Oca granaiola *Anser fabalis*

2 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) il 27 gennaio e il 16 febbraio (G. Silveri, F. Salvini, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [4]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano concentrazioni consistenti.

4.900 indd. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (censimenti IW), con presenza di 2.000-5.000 indd. tra Valle Zignago

e Valle Vecchia di Caorle (VE) dalla seconda decade di dicembre 2012 alla prima decade di marzo (P. Vacilotto, F. Piccolo, F. Salvini, G. Silveri, M. Favero, E. Stival et al. [2] [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

3.000 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (censimenti IW).

2.000-5.000 indd. tra Valle Zignago e Valle Vecchia di Caorle (VE) dalla seconda decade di dicembre a marzo 2014 (M. Ballan, E. Stival et al. [2]).

Oca selvatica *Anser anser*

Si elencano una concentrazione consistente e un individuo marcato.

1.188 ind. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in Valle Grassabò (VE) tra l'8 e il 15 febbraio, marcato con collare ceco "T64" (L. Panzarin, E. Stival [2]) applicato da adulto a Plástovice in Repubblica Ceca nel giugno 2012 (archivio ISPRA); l'ind. era stato osservato a Valle Zavelea (FE) nel dicembre 2012 (M. Azzolini et al.).

Oca del Canada *Branta canadensis*

Si elencano le segnalazioni al di fuori della provincia di Treviso dove è presente un nucleo insediatosi in seguito a immissioni sul fiume Sile.

1 ind. in Valgrande di Bibione (VE) e 1 ind. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (L. Sattin, L. Panzarin).

3 ind. a Villa Contarini (PD) il 15 gennaio, quindi 5 ind. il 2 marzo e 4 ind. il 29 novembre (G. Piras, M. Cargasacchi, E. Stival, L. Schiavon [5]).

1 ind. in Valle Figheri (VE) il 16 gennaio (G. Cherubini, A. Farioli, L. Boscain [5]).

5 ind. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (M. Basso, A. Sartori).

17 ind. alla cava di Bosco di Rubano (PD) il 24 gennaio, 10 ind. il 23 marzo e 1 cp. con 7 pulli l'11 maggio (G. Piras, G. Zogno [5]).

3 ind. ad Arsiè (BL) il 17 aprile (P. Pedrini [5]).

3 ind. nelle risaie di Marina Nuova di Porto Levante (RO) tra il 19 e il 26 giugno (A. Tonelli, F. Piccolo, M. Crivellari [5]).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. in Valle Morosina (PD) il 23 febbraio (L. Sattin, L. Boscain [2] [4]).

1 ind. sul campanile di Saletto di Breda di Piave (TV) tra aprile e agosto (L. Boscain); individuo verosimilmente afluì qui già segnalato dal 2008 (cfr. SIGHELE et al. 2009, 2010, 2011).

La presenza di individui di dubbia provenienza rende complicato attribuire uno status preciso a questa specie; complessivamente potrebbe essere considerata di comparsa irregolare in Veneto ma le segnalazioni di individui di verosimile origine selvatica, osservati in periodo invernale in concomitanza di svernamenti numericamente importanti di oche lombardelle o granaiole, dovrebbero essere una decina negli ultimi cinquant'anni.

Branta canadensis* x *Branta leucopsis

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 febbraio (P. Vacilotto [4]).

Oca collaroso *Branta ruficollis*

1 ind. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra il 14 gennaio e il 16 febbraio (L. Panzarin, F. Salvini, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [4] [5]).

Dovrebbe essere l'undicesima segnalazione per il Veneto di questa specie, l'ottava degli ultimi cinquant'anni; confermata dal GSR.

Casarca *Tadorna ferruginea*

L'origine degli individui elencati è dubbia per la presenza sia di afluì sia di soggetti che originano da popolazioni naturalizzate in Europa.

1-3 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), dal 24 dicembre 2012 ad aprile e poi ancora 1 ind. in novembre e in dicembre (M. Faccioli, C. Zanini, E. Tonelli et al. [1] [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

Nel Delta del Po (RO) 1 ind. in Valle Spolverina l'8 gennaio, quindi 1 ind. in Valle Sagreda il 26 febbraio e successivamente tra il 12 e il 27 aprile, infine 1 ind. in Valle Veniera tra il 13 maggio e il 25 giugno (M. Crivellari, P. Ronconi, A. Pastorini, M. Passarella, M. Cargasacchi, G. Dalle Vedove [5]).

12 ind. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio e 3 ind. il 3 febbraio (L. Panzarin, A. Tonelli, G. Piras, C. Fassina [5]).

- 1 ind. in Laguna del Mort (VE) il 20 aprile (E. Stival [2] [4]).
1 ind. a Castelnuovo d/G (VR) il 29 agosto (C. Zanini [1]).
3 indd. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), il 5 settembre (S. Mazzotti).
1 ind. al Lago del Restello (TV) il 5 ottobre (G. Silveri [5]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in acque interne.

- 14.007 indd. nel Delta del Po (RO) a metà gennaio (censimenti Sagittaria).
7.925 indd. in Laguna di Venezia il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Ronco all'Adige (VR) il 16 gennaio (M. Sighele, L. Lodde [1]).
10 indd. al lago di Busche (BL) il 17 gennaio (G. Tormen [5]).
1 ind. a Montalto, Nogara (VR), il 9 aprile (G. Dalle Vedove [5]).
1 ind. al lago di Busche (BL) il 17 e il 18 novembre (S. de Menech, M. Cassol [5]).
10 indd. a Lido Ronchi, Castelnuovo d/G (VR), il 26 novembre, in seguito 2 indd. il 7 dicembre e 1 ind. il 30 dicembre (C. Zanini, R. Lercio, C. Izzo [1]).

Fischione *Anas penelope*

Si elencano concentrazioni consistenti.

- 15.500 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (censimenti IW).
52.935 indd. nel Delta del Po (RO) il 19 febbraio (censimenti Sagittaria).

Canapiglia *Anas strepera*

Si elencano informazioni relative alla nidificazione.

- La specie si conferma nidificante nel Delta del Po (RO), in particolare nelle valli Ripiego, Chiusa e Ca' Pasta così come sullo Scanno Cavallari, probabilmente anche in altre valli (E. Verza, com. pers.).
1 f. con 5 pulli in Valle Liona (VE) il 24 giugno (M. Cappelletto - ZANETTI, in stampa).

Alzavola *Anas crecca*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

- 173.169 indd. in Laguna di Venezia, di cui 54.100 indd. in Valle Dragojesolo (VE) e 46.150 in Valle Morosina (PD), il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).
14.971 indd. nel Delta del Po (RO) il 5 febbraio (censimenti Sagittaria).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si riporta la concentrazione più consistente.

- 65.561 indd. in Laguna di Venezia il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

Codone *Anas acuta*

Si riporta la concentrazione più consistente.

- 20.447 indd. in Laguna di Venezia, di cui 18.000 indd. in Valle Dragojesolo (VE), il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

Marzaiola *Anas querquedula*

Si riportano le uniche informazioni relative all'accertamento della nidificazione.

- 1 cp. certamente nidificante in Valle Chiusa (RO) e possibili altre cpp. nelle Valli di Rosolina (RO) (E. Verza et al.).

Mestolone *Anas clypeata*

Si riporta la concentrazione più consistente.

3.315 indd. nel Delta del Po (RO) a metà gennaio (censimenti Sagittaria).

Fistione turco *Netta rufina*

Specie di presenza regolare e nidificante localizzata, si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione nelle province di Venezia e Verona, oltre a segnalazioni al di fuori del complesso lacustre del Garda.

Sulla sponda veronese del lago di Garda (VR): 50 indd. il 13 gennaio, 86 indd. a metà marzo (M. Sighele, L. Mazzola, A. Pigozzo et al. [1]), 89 indd. nel solo tratto tra Garda e Navene il 25 marzo (M. Sighele, R. Vignola [1]). L'inverno successivo 50 indd. tra Garda e Navene alla fine di dicembre (R. Lerco, G. & M. Sighele [1]). La nidificazione è stata accertata a Peschiera d/G e a Malcesine con la presenza di pulli nel mese di giugno (M. Sighele, R. Vignola, G. Zogno [1] [5]).

2 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) il 12 febbraio (M. Passarella).

A Valle Vecchia di Caorle (VE) 70-110 indd. tra il 27 marzo e il 10 aprile (L. Boscain, A. Sartori, F. Scarton [2] [5]); la nidificazione è stata accertata con la presenza di pulli a partire dal 26 maggio (A. Luchetta, G. Sgorlon, E. Stival et al.).

1 ind. al lago di Misurina (BL) tra il 20 settembre e il 3 ottobre (G. Marocchi, R. Schmiegelt [5]).

1 ind. al lago di Busche (BL) tra il 21 settembre e l'11 ottobre (N. Barp, M.E. Bibelia, M. Crivellari [5]).

1-4 indd. in Laguna del Basson (RO) il 22 e il 23 settembre (M. Zappaterra).

9 indd. in Valle Morosina (PD) il 21 novembre (L. Sattin [5]).

Moriglione *Aythya ferina*

Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.

3.000 ind. in Valle Morosina (PD) il 16 gennaio (censimenti IW).

La specie si è nuovamente riprodotta in tutti i settori vallivi del Delta del Po (RO) con oltre 70 cpp. (E. Verza et al.).

5.000 indd. nel Delta del Po (RO) il 18 novembre (E. Tessarin).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano la concentrazione più consistente e segnalazioni in periodo invernale o riproduttivo.

1-2 indd. sul Sile a Barbasso di Morgano (TV) tra il 29 dicembre 2012 e il 17 marzo (F. Salvini, P. Vacilotto, R. Giubilato [4] [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

1-7 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 6 e il 26 gennaio, 6-7 indd. in febbraio (L. Panzarin, L. Boscain, G. Silveri, M. Favero, E. Stival et al. [2]). Successivamente 2 indd. l'8 giugno, quindi 10 indd. il 20 novembre, 3 indd. il 26 novembre, 1 ind. il 31 dicembre (F. Piccolo, G. Sgorlon, E. Stival et al. [2] [4]).

1 ind. in golena Carpano, Po di Maistra (RO), l'8 gennaio (L. Bedin, A. Favaretto, R. Giubilato, L. Zanella).

4 indd. in Cassa di Colmata A (VE) il 15 gennaio (M. Baldin).

30 indd. in Valle Morosina (PD) nella seconda metà di agosto e 42 indd. il 20 settembre (L. Sattin [5]).

6 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 31 dicembre (P. Suhonen).

Aythya nyroca* x *Aythya ferina

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 marzo (L. Panzarin).

1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 31 dicembre (P. Suhonen).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 31 dicembre (E. Stival, F. Piccolo [2] [4]).

Moretta *Aythya fuligula*

Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.

Tra 1.500 e 2.500 indd. al laghetto del Frassino (VR) tra gennaio e metà marzo (M. Sighele et al. [1]).

Nidificazione confermata al lago di Busche (BL) e al Vincheto di Celarda (BL) con la presenza di covate dalla metà di luglio (N. Barp).

Nidificazione accertata nel Delta del Po (RO) in Valle Chiusa, Valle Ripiego e Valle San Carlo, con presenza di pulli a partire dal 5 giugno (E. Verza, M. Crivellari et al.).

Nidificazione accertata di oltre 20 cpp. al Parco del Fiume Sile nei comuni di Treviso e Quinto di Treviso (TV) con la presenza di pulli a partire dal 29 giugno (F. Salvini, A. Pastorini [5]).

Moretta grigia *Aythya marila*

2 indd. in Valle Morosina (PD) il 4 e il 16 gennaio e 1-4 indd. tra il 10 e il 23 febbraio (L. Sattin, M. Basso, A. Sartori,

L. Boscain, M. Passarella [5]).

1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 14 gennaio, 3 mm. il 10 e l'11 marzo, 1 f. il 16 marzo (M. Sighele, G. Dalle Vedove, C. Zanini, L. Chesini [1] [5]).

1 m. al laghetto del Frassino (VR) il 31 dicembre (P. Suhonen).

Edredone *Somateria mollissima*

1 m. al Lido di Venezia tra il 5 gennaio e l'11 marzo (S. Castelli, M.G. Mitri et al. [2] [4]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

2 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 28 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Orco marino *Melanitta fusca*

3-14 indd. sul lago di Garda tra Pacengo e Lido Ronchi (VR) tra il 10 dicembre 2012 e il 4 febbraio (M. Sighele, R. Lerco, C. Izzo, C. Zanini, M. D'offria et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013); 6 indd. nel golfo di Peschiera d/G il 27 gennaio (D. Bernasconi [5]).

21 indd. tra la foce del Tagliamento e Porto Baseleghe (VE) e 4 indd. tra la foce del Sile e il Lido di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in ambiente urbano a Verona tra il 19 e il 25 gennaio (M. & G. Sighele, C. Izzo, P. Bertini, A. Pigozzo [1]).

2 indd. in volo a Cortellazzo, Jesolo (VE), il 22 febbraio (S. Davison [2]) e 1 ind. a Porto Santa Margherita, Caorle (VE), il 23 marzo (F. Mezzavilla [5]).

10 indd. nel golfo di Peschiera d/G (VR) l'1 dicembre (R. Lerco, A. Berardo [1]).

5 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 28 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

Si elencano la concentrazione invernale più consistente e una segnalazione in ambito fluviale.

1 ind. a Quinto di Treviso il 10 dicembre (F. Salvini [5]).

20 indd. al lago di Santa Croce (BL) il 27 dicembre (G. Tormen [5]).

Pesciola *Mergellus albellus*

1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre e il 12 gennaio 2014 (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo, C. Zanini et al. [1]).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano una concentrazione consistente e le segnalazioni al di fuori dell'areale noto di nidificazione e di presenza regolare durante tutto il corso dell'anno.

1 m. a Trepalade (VE) il 19 gennaio (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Sul lago di Garda (VR): 4 indd. a Lido Campanello il 30 gennaio e 1 m. il 16 marzo (D. Bernasconi, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [4]); tra Torri d/B e Pai: 1 cp. il 5 febbraio e il 24 marzo e in seguito 1 f. il 9 giugno e 4 indd. il 12 agosto (L. Mazzola, M. Sighele, R. Vignola, M. Faccioli et al. [1]); a Malcesine: 2 indd. il 16 marzo, 1 m. l'1 aprile e 1 cp. il 13 aprile, quindi 16 indd. del 1° anno il 29 giugno e 3 indd. il 19 luglio (M. Lezzi, F. Bricolo, G. Zogno [1] [5]); 6 indd. nei pressi di Castelletto il 20 agosto e 1 cp. il 29 dicembre (M. & G. Sighele, C. Zanini et al. [1]); 1 f. a Garda tra il 28 e il 30 dicembre (A. Pigozzo, G. Dalle Vedove et al. [1] [5]).

1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) il 13 maggio (F. Moretto, R. Levert [5]).

53 indd. al lago del Corlo (BL) il 18 agosto (G. Silveri et al. [2]).

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 26 ottobre e il 25 novembre (A. Bossi, M. Panzarin, D. Fasano et al. [2] [4] [5]).

Si tratta della sesta segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Venezia (MORBIOLI & SIGHELE, 2006; BON et al., 2008; SIGHELE et al., 2009, 2011, 2013).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

1 ind. al Lido di Venezia il 30 dicembre 2012, il 5 e il 15 gennaio, il 3 febbraio, osservato moribondo il 3 maggio (A. Marin, S. Castelli, M.G. Mitri et al.).

1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in Valle Dogà (VE) il 16 gennaio (censimenti IW).

1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) fra il 23 e il 28 gennaio (F. Moretto, F. Salvini, D. De Marchi et al. [5]).

1 ind. tra Caposile e Jesolo (VE) fra il 9 febbraio e il 22 marzo (F. Salvini, P. Ugo, E. Stival et al. [2] [4]).

2 indd. in volo a Cortellazzo (VE) il 22 febbraio (S. Davison [2]).

1 ind. al Lido di Venezia il 9 novembre e il 31 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri [2] [4]).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

13 indd. nel medio lago di Garda orientale (VR) il 13 gennaio (M. Azzolini, K. Comploj, M. Di Tolla [1]).

Fino a 18 indd. nel medio lago di Garda orientale (VR) tra il 17 novembre e il 29 dicembre (G. Dalle Vedove, C. Zanini, G. Balestrieri et al. [1] [5]).

Pelecaniformes

Sulidae

Sula *Morus bassanus*

1 ind. al Lido di Venezia il 19 maggio (A. Sartori [4]).

1 ind. al largo di Jesolo (VE) il 19 agosto (D. Comin).

2 indd. a Eraclea Mare (VE) il 16 settembre (G. Sgorlon [2] [4]).

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Si elencano informazioni relative alla nidificazione e un individuo marcato.

1 ind. a Tessera (VE) tra il 23 dicembre 2012 e il 17 marzo e successivamente anche il 2 novembre, marcato con anello estone "CTM" (E. Stival, V. Polo, M. Cargasacchi, A. Pastorini et al.); era stato inanellato da pullo in Estonia sull'isola Saremaa nel luglio 2012 (archivio ISPRA).

Nidificazione accertata alla foce del Po di Gnocca (RO) con 20 cpp. (E. Stival et al. [4]).

In provincia di Venezia questa specie si riproduce ogni anno dalla fine del XX secolo (SCARTON et al., 2013) mentre nel Delta del Po di Rovigo la sua nidificazione è assai irregolare.

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

Le osservazioni provengono solo dalle province di Rovigo e di Venezia; si elencano una concentrazione consistente e un individuo marcato.

1 ind. a Tessera (VE) il 16 giugno e a Malamocco (VE) il 2 agosto, marcato con anello croato "B52" (M. Cargasacchi, L. Sattin, A. Sartori, R. Faè.); era stato inanellato in Croazia sull'isola Galija, arcipelago delle Brioni, nell'aprile 2012 ed era stato osservato a Malamocco anche tra giugno e agosto 2012 (archivio ISPRA).

350 indd. agli Alberoni (VE) il 26 ottobre (L. Sattin, R. Faè, A. Sartori [5]).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.

7.550 indd. contati ai dormitori in provincia di Venezia, di cui 6.200 indd. in Valle Dragojesolo (VE), il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

180-190 indd. contati ai dormitori sul Sile (TV) nel mese di gennaio (F. Mezzavilla).

1 ind. a Tezze sul Brenta (VI) il 30 giugno (F. Moretto [5]).

1 ind. a Pederobba (TV) il 28 novembre (G. Silveri et al. [4]).

Ciconiiformes

Ardeidae

Tarabusino *Ixobrychus minutus*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 f. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 febbraio (P. Vacilotto [4]).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Si elencano concentrazioni consistenti durante il periodo invernale.

147 indd. in Valle Dogà (VE) il 17 gennaio (M. Bon).

40 indd. alle foci dell'Adige (VE/RO) il 16 dicembre (A. Tonelli [5]).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Si elencano concentrazioni consistenti al di fuori del periodo riproduttivo e una segnalazione in sito inusuale.

902 indd. al roost di Villa Contarini (PD) il 15 gennaio (G. Piras [5]).

450 indd. all'Oasi Cave di Gaggio Nord (VE) il 29 settembre (M. Chillon).

350 indd. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), il 19 ottobre (P. Bertini, C. Chiappisi, C. Izzo [1]).

5 indd. in Lessinia (VR) a San Rocco, Roverè V.se, 645 m s.l.m., il 14 dicembre (R. Lerco [1]).
450 indd. al roost di Castelfranco Veneto (TV) il 29 dicembre (G. Silveri [5]).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. a Grezzano di Mozzecane (VR) il 15 giugno (G. & M. Sighele et al. [1]); verosimilmente lo stesso individuo è stato osservato a Vigasio (VR) il 22 luglio (A. Mosele [5]).

Escludendo gli individui ritenuti ibridi, questa dovrebbe rappresentare l'undicesima segnalazione per il Veneto, la seconda osservazione in provincia di Verona.

Garzetta *Egretta garzetta*

Si riporta una concentrazione consistente.

500 indd. a Bressanvido (VI) il 26 dicembre (W. Sassi [5]).

Egretta gularis* x *Egretta garzetta

1 ind. nelle Valli di Albarella (RO) tra il 23 e il 28 settembre (M. Passarella, F. Piccolo, A. Bossi et al. [3] [5]).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

Si riportano le segnalazioni di un individuo marcato.

1 ind. il 9 novembre e l'8 dicembre nei pressi di Isola d/S (VR), marcato con anello ungherese "A90" (C. Izzo, M. & G. Sighele); era stato inanellato da pullo in Ungheria a Csépa il 26 giugno 2013 (archivio ISPRA).

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Si riporta una aberrazione di piumaggio.

1 ind. parzialmente melanico a Ca' Emo di Adria (RO) il 28 febbraio (D. Trombin).

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

2 indd. in volo sopra Treviso il 12 marzo (F. Salvini, R. Storer [5]).

1 ind. in volo sopra Maser (TV) il 17 marzo (R. Levert [5]).

1 ind. in volo sopra Verona il 23 aprile (M. D'offria [1]).

2 indd. in volo sopra Sant'Elena di Silea (TV) il 4 maggio (P. Vacilotto [4]).

2 indd. a Moriago della Battaglia (TV) il 21 maggio (G. Silveri [4]).

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR) il 29 maggio (A. Mosele [5]).

Durante la migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS): 2 indd. il 25 agosto (A. Gargioni, E. Forlani et al.).

9 indd. durante la migrazione sui Colli Asolani (TV/BL) tra il 28 agosto e il 4 settembre (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Martignago, D. Foltran, G. Silveri [4] [6]).

8 indd. in alta Val Fraselles, Lessinia (VR), il 30 agosto (L. Longo [1]).

3 indd. in volo sopra Verona il 31 agosto (C. Izzo, M. Allen, R. Lerco [1]).

1 ind. in volo sopra il Bosco del Montello (TV) il 3 settembre (R. Storer [5]).

1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 24 settembre (E. & M. Cavallini [1]).

2 indd. a Tormine di Mozzecane (VR) il 29 e 1 ind. il 30 settembre (M. Cordioli, S. Barugola, C. Zanini [1]).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Si riporta una concentrazione interessante in periodo invernale.

40 indd. ca. a Spinea (VE) il 27 dicembre (E. Zanetti [2]).

Threskiornithidae**Mignattaio *Plegadis falcinellus***

2 indd. in Valle Paliaga (VE) il 15 e il 16 aprile, osservati anche in volo sopra l'Oasi Cave di Gaggio Nord (VE), (M. Pegorer, E. Stival, M. Chillon et al. [2]).

1 ind. in Laguna del Basson (RO) il 22 aprile (C. Valdini [5]).

3-5 indd. tra il Bacchiglione e il Brenta nei pressi di Chioggia (VE) il 22 aprile e il 23 maggio (F. Piccolo, M. Passarella, R. Valle [2] [4]).

12 indd. nei pressi di Caldogno (VI) il 12 maggio (M. Fabrello [5]).

4 indd. in Cassa di Colmata D/E (VE) il 14 maggio (F. Scarton [5]).

2 indd. in volo sopra la Tenuta Civrana (VE) il 19 maggio (A. Tonelli [2] [4]).

2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 maggio (B. Dentesani [5]).

1 ind. alla Busa di Giarretta (PD) il 28 settembre (F. Moretto [5]).

3 indd. a Mozzecane (VR) il 21 ottobre (M. Cordioli [1]).

3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l'1 e il 17 novembre (F. Consonni, E. Stival et al. [2]).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

2-4 indd. a Roncade (TV) tra l'1 gennaio e il 3 marzo (L. Mauro, R. Storer, M. Stefani [5]).

1 ind. tra Sindacale e Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 3 gennaio e il 23 febbraio (L. Panzarin, M. Panzarin, S. Bottazzo, E. Stival, L. Benatelli [2] [4]).

1 ind. a Canalnovo (RO) il 9 gennaio (A. Barbieri).

1 ind. a Isola d/S (VR) il 12 gennaio (A. Rigon [1]), successivamente 20-50 indd. tra Vigasio e Isola d/S (VR) fra il 23 febbraio e il 5 marzo (L. Cattani, E. Cavallini, V. Fanelli, A. Pigozzo, A. Mosele [1] [5]).

6 indd. a Vallese di Oppeano (VR) il 14 gennaio (D. Turri).

2 indd. a Ronco all'Adige (VR) il 16 gennaio (M. Sighele, L. Lodde et al. [1]).

3-4 indd. tra Marteggia e Ca' Tron (VE) tra il 22 gennaio e il 6 febbraio (L. Panzarin, I. Mazzon).

19 indd. a Trevenzuolo (VR) il 13 marzo e successivamente 2-12 indd. fino al 16 giugno (E. & M. Cavallini, G. & M. Sighele, V. Fanelli et al. [1]).

10-15 indd. tra Caselle di Isola d/S e Mazzantica di Oppeano (VR) fra il 19 e il 27 marzo (M. D'offria, N. Daz [1]).

1 ind. in risaia a Sorgà (VR) tra il 13 e il 20 aprile e 2 indd. il 22 aprile (E. Cavallini, M. Sighele, C. Izzo, V. Fanelli [1]).

1 ind. nei pressi della garzaia di Pellegrina, Isola d/S (VR) il 18 aprile e 2 indd. il 13 giugno, ma senza avvisaglie di nidificazione (C. Izzo, M. Cordioli, S. Barugola [1]).

10 indd. in volo a Venezia il 24 aprile (G. Vecchiato [5]).

6 indd. a Erbè (VR) il 18 maggio (M. Sighele [1]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 21 maggio (D. Trombin, L. Zanella).

1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) l'11 luglio (A. Tonelli [5]).

1 ind. all'Isola della Donzella (RO) il 2 agosto (P. Melandri [5]).

1 ind. in Valle Dogà (VE) il 17 settembre (M. Bon [2]).

3 indd. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), il 17 dicembre (A. Mosele [5]).

2 indd. all'Oasi Brusà, Cerea (VR), il 20 dicembre (R. Pollo).

1 ind. a Casier (TV) il 26 dicembre (F. Manzan).

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano concentrazioni consistenti e individui marcati.

71 indd. in Valle Liona (VE) il 17 gennaio e 38 indd. in Valle Dogà (VE) il 17 gennaio (M. Bon, L. Panzarin).
42 indd. in Valle Ca' Zuliani, 11 indd. in Valle Sacchetta e 15 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) il 5 febbraio (D. Sartori, P. Ronconi, A. Bocchi, L. Boscain, L. Cogo, L. Zanella).

1 ad. e 2 juvv. alla Tenuta Civrana (VE) il 12 luglio (A. Tonelli [2] [3] [4]); i 2 juvv. erano marcati con anello italiano "142" e "143" applicato alla colonia di Bando (FE) nel mese di maggio (S. Volponi, com. pers.).

1 ind. al Bosco delle Lame (VE) il 28 luglio, marcato con anello ungherese "IJ79" (L. Benatelli [5]); era stato inanellato da pullo in Ungheria a Hortobagy nel maggio 2011 e segnalato nelle settimane precedenti a questa osservazione a Valle Mandriole (RA) il 19 giugno e all'Isola della Cona (GO) tra il 2 e il 25 luglio, mentre ha svernato in Tunisia (archivio ISPRA).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopterus roseus*

Si elencano concentrazioni consistenti, notizie relative alla nidificazione, individui marcati all'estero e segnalazioni in siti inusuali.

5.212 indd. nel Delta del Po (RO) il 5 febbraio (censimenti Sagittaria).

1 ind. in Valle Dogà (VE) il 9 e il 10 marzo, marcato con anello francese "FZNC" (E. Stival, L. Panzarin); era stato inanellato da pullo in Francia in Camargue nel luglio 2006 (archivio ISPRA).

La specie ha nidificato a Valle Paleazza (VE) dove si è insediata alla fine di aprile, contati 2.989 nidi, involatisi in seguito circa 1.650 pulli (L. Panzarin).

1 ind. in Valle Veniera (RO) tra il 19 e il 21 luglio, marcato con anello spagnolo "X|PDL" (E. Stival et al.); era stato inanellato da pullo in Spagna a Tarragona nel luglio 2012 (archivio ISPRA).

3.000 indd. in Valgrande di Bibione (VE) a fine agosto, poi anche in volo su Valle Dogà (VE) il 17 settembre (L. Panzarin, M. Bon [2]).

6 indd. in volo sopra il golfo di Peschiera d/G (VR) il 2 settembre (C. Izzo, M. Allen [1]).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

Si riporta una concentrazione consistente.

700 indd. ca. davanti a Maraschina, Peschiera d/G (VR), tra il 10 e il 22 marzo (M. Sighele [1]).

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

1 ind. dell'anno a Lio Piccolo (VE) tra l'11 e il 21 agosto (M.G. Mitri, N. Lodigiani, S. Gentilin et al. [2]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 17 e il 24 novembre (L. Gelfi, M. Cargasacchi, E. Stival, G. Gaudenzi et al. [2] [4]).

1 ind. a Navene, Malcesine (VR), il 25 novembre (G. Speranza [5]), quindi 1 ind. a Malcesine il 24 dicembre, poi ancora 1 ind. a Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 27 dicembre e fine febbraio 2014 (R. Lerco, M. & G. Sighele, M. D'offria, C. Izzo, C. Zanini et al. [1]).

1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 6 dicembre (L. Sattin, A. Sartori [5]).

1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre e il 2 gennaio 2014 (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo, C. Zanini et al. [1]).

1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 28 dicembre (G. Zogno [4]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

- 3 indd. in Laguna di Barbamarco (RO) l'8 gennaio (D. Sartori, D. Trombin).
2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 10 e il 26 gennaio (M. Passarella, M. Crivellari, A. Mattioli [4] [5]).
1 ind. in Laguna di Giare (VE) il 15 gennaio (A. De Favero).
1 ind. nel canaletto del Cornio presso Valle Zappa (VE) il 16 gennaio (D. Cester).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 23 novembre (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [4]).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Si riporta una segnalazione in località inusuale.

- 1 ind. recuperato con qualche segno di difficoltà a Belluno il 27 luglio, inanellato e subito dopo liberato sul Piave (G. Tormen).

Falconiformes**Accipitridae****Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus***

Si riportano i conteggi durante la migrazione postriproduttiva.

Durante la migrazione postriproduttiva sui Colli Asolani (BL/TV) sono stati contati 11.291 indd. con picco di circa 2.874 indd. il 30 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri, G. Martignago, D. Foltran et al. [4]). Conteggi inferiori sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) per una minore copertura (A. Gargioni).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Si elencano segnalazioni in pianura in periodo riproduttivo.

- 1 ind. in Bonifica del Loncon (VE) l'8 giugno (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
1 ind. al Bosco delle Lame (VE) il 13 giugno (G. Sgorlon [2]).

Nibbio reale *Milvus milvus*

- 1 ind. nei pressi di Bovolone (VR) già il 29 dicembre 2012 e in seguito 2 indd. tra Bovolone e San Pietro di Morubio nei pressi di Bonavicina (VR) fino alla fine di febbraio quando sono stati osservati 4 indd. il giorno 26 (R. & D. Passarini, S. Caffarri, M. & G. Sighele [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
3 indd. sul Sile a Menaredo, Piombino Dese (PD), il 24 febbraio (F. Salvini [5]).
1 ind. sul lago di Busche (BL) il 23 marzo (M. Varaschin [5]).
1 ind. a Navene, Malcesine (VR), l'1 aprile (C. Zanini [1]).
1 ind. in volo sopra il Vinchetto di Celarda (BL) il 14 aprile (N. Barp, D. Quaranta [5]).
1 ind. a Pederobba (TV) l'1 maggio (G. Silveri [5]).
1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 21 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 25 giugno (G. Silveri [4]).
1 ind. nei pressi di Ponte nelle Alpi (BL) il 27 luglio (L. Bonanno [5]).

Capovaccaio *Neophron percnopterus*

- 1 ind. a Carve di Mel (BL) il 12 giugno (L. Savi).
Rappresenta la terza segnalazione veneta degli ultimi cinquant'anni (LEPORATI et al., 1985; DE FRANCESCHI, 1996).

Grifone *Gyps fulvus*

- 1 ind. a Chiarano (TV) il 29 ottobre, marcato con anello croato applicato qualche mese prima sull'isola di Veglia (L. Panzarin).

Biancone *Circaetus gallicus*

Si riporta una segnalazione in pianura in periodo inusuale.

1 ind. a Portobuffolè (TV) il 29 giugno (G. Sgorlon [4]).

Albanella reale *Circus cyaneus*

Si elencano segnalazioni in periodi inusuali.

1 m. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 maggio (G. Dalle Vedove [1]).

1 m. nelle Valli Grandi Veronesi (VR) il 23 maggio (P. Bertini [1]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. a Polesine Camerini (RO) il 3 aprile (L. Zanella [4]).

1 m. a Tessera (VE) il 19 aprile (L. Panzarin).

1 ind. a Sorgà (VR) il 20 aprile (C. Izzo [1]).

1 ind. in Laguna di Barbamarco, di fronte a Valle Ripiego (RO), il 29 agosto (F. Fanesi).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 26 settembre (F. Zanatta).

Specie segnalata in undici degli ultimi dodici anni per cui andrebbe oggi considerata di comparsa regolare, seppur scarsa, in Veneto (BON et al., 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; SIGHELE et al., 2009, 2010, 2011, 2013).

Albanella minore *Circus pygargus*

Si elencano segnalazioni di individui con trasmettitore satellitare.

1 f., dopo avere svernato in Burkina Faso, ha risalito l'Italia ai primi di maggio passando tra Venezia e Treviso per tornare ai siti di nidificazione in Olanda nei pressi di Groningen; da qui è tornata verso l'Africa passando sopra Verona intorno all'11 settembre. Percorre ogni anno queste rotte almeno dal 2010 quando è stata dotata di radiosatellitare olandese (werkgroepgrauwekiekendief.nl).

1 f., dopo avere svernato in Mali, ha risalito l'Italia passando da Verona e Treviso intorno al 30 aprile per poi proseguire verso Brandeburgo dove ha nidificato. Percorre ogni anno queste rotte almeno dal 2010 quando è stata dotata di radiosatellitare olandese (werkgroepgrauwekiekendief.nl).

Astore *Accipiter gentilis*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

1 ad. a Faè di Oderzo (TV) tra il 19 e il 31 gennaio (G. Sgorlon).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 17 novembre (L. Panzarin).

Poiana *Buteo buteo*

Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. *vulpinus* (poiana delle steppe).

1 ind. a Velo d'Astico (VI) il 31 marzo (I. Martini [4] [5]).

1 ind. sul Pian del Cansiglio (BL) il 5 e il 6 ottobre (G. Silveri, C. Poloni, M. Favero, B. Zampogno, E. Lion, U. Battistella et al. [4] [5]).

Sono state elencate le uniche segnalazioni comprovate da immagini fotografiche.

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

2 indd. durante la migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 5 settembre (A. Gargioni et al.).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

1 ind. nelle bonifiche dell'isola della Donzella (RO) il 23 e il 29 dicembre 2012, poi osservato a Ca' Venier l'8 gennaio (C. Fiorini, F. Moratelli, A. Bossi, L. Bedin [2] [4] [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ind. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra il 18 dicembre 2012 e il 17 febbraio (L. Panzarin, E. Stival, G. Silveri et al. [2] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

1 ind. a Santa Giulia (RO) il 2 novembre (M. Valente).

Aquila minore *Aquila pennata*

1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 10 marzo (A. Nardo [2]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 19 ottobre (S. Faganello [5]).

1 ind. a Cimadolmo (TV) e poco dopo verosimilmente lo stesso individuo a Oderzo (TV) il 26 ottobre (G. Sgorlon, F. Zanatta [2]).

Pandionidae**Falco pescatore *Pandion haliaetus***

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 4 giugno (L. Sattin [5]).

Falconidae**Grillaio *Falco naumanni***

5-20 indd. alla Bonifica del Loncon (VE) tra il 28 aprile e il 2 giugno (A. Nardo, E. Stival, M. Cargasacchi, G. Sgorlon, S. Bottazzo, F. Piccolo et al. [2] [4]).

1 ind. a Montalto di Nogara (VR) il 9 maggio (C. Izzo [1]).

1 ind. a Papozze (RO) il 13 maggio (M. Rocchi [5]).

2-4 indd. a Corte Val Vecchia, Castagnaro (VR), tra il 25 maggio e l'1 giugno (P. Bertini, M. Sighele, C. Izzo, M. Allen [1]).

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 12 giugno (M. Busato [5]).

2-10 indd. tra Cancellò e Trezzolano, Verona, tra il 21 agosto e il 9 settembre (R. Lerco, C. Zanini, C. Izzo, M. D'offria [1]).

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 30 agosto (A. Tonelli [4] [5]).

1-3 indd. a Santa Viola, Grezzana (VR), tra il 4 e il 6 settembre (M. D'offria [1]).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Si elencano segnalazioni in periodo riproduttivo e individui marcati.

1 ind. in Bonifica di Lison (VE) tra il 27 e il 31 maggio, marcato con anello ungherese (E. Stival, L. Panzarin).

Nidificazione accertata di 3 cpp. alla Bonifica del Loncon (VE) con la presenza di 1 juv. da poco involato l'1 agosto (L. Panzarin, G. Sgorlon).

1 ind. a Dosso Alto in Lessinia (VR) il 5 settembre, marcato con anello ungherese (C. Izzo [1]).

Falco della Regina *Falco eleonorae*

1 ind. sui Colli Euganei (PD) l'8 giugno (A. Tonelli [2] [3] [4] [5]).

Le osservazioni venete di questa specie, tutte dal 1996 in poi, sono ora 16; la specie è stata osservata ogni anno tra il 2009 e il 2013.

Sacro *Falco cherrug*

1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 10 marzo (A. Nardo [2] [5])

Dovrebbe trattarsi della nona segnalazione veneta degli ultimi cinquant'anni (SIGHELE et al., 2013).

Gruiformes**Rallidae****Re di quaglie *Crex crex***

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'areale riproduttivo noto.

1 ind. a Campofontana (VR) il 26 giugno (M. Bertacco [1]).

Folaga *Fulica atra*

Si riporta la concentrazione più consistente.

23.957 indd. in Laguna di Venezia il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

Gruidae**Gru *Grus grus***

Si elencano gruppi numerosi, le segnalazioni di individui in periodo inusuale o in sosta durante il periodo invernale.

17 indd. a Sindacale (VE) il 12 gennaio e 6-12 indd. a Brussa (VE) il 14 e il 26 gennaio (E. Stival, M. Cargasacchi, R. Trabucco, C. Valdini, L. Panzarin [2]).

Oltre 110 indd. in volo sopra Volpago del Montello (TV) il 9 marzo (F. Manzan [2] [4]).

102 indd. in volo sopra Zero Branco (TV) il 12 marzo (F. Salvini [5]).

100 indd. in volo sopra la parte terminale dell'Adige (RO) il 12 marzo (M. Passarella).

3 indd. in Bonifica del Loncon (VE) l'8 giugno (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Circa 300 indd. in volo sopra Martellago (VE) e 50 indd. sopra il Lido di Venezia l'1 novembre (R. Giubilato, A. Borgo [5]).

154 indd. in volo sopra Montebelluna e Volpago del Montello (TV), inoltre 215 indd. posati alle Grave di Ciano (TV) l'1 novembre (E. Romanazzi, C. Bettio [5]).

250 indd. sopra Borgoricco (PD) l'1 novembre (T. Abbà [5]).

Circa 200 indd. in volo sopra Cimadolmo e poi sopra Altivole (TV) il 2 novembre (F. Zanatta, M. Barduca).

Oltre 100 indd. in volo sopra Povegliano V.se (VR) il 2 novembre (E. Cavallini [1]).

Otididae**Gallina prataiola *Tetrax tetrax***

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 19 settembre (F. Zanatta).

Si tratta della quinta segnalazione nota per il Veneto negli ultimi cinquant'anni (SGORLON & SIGHELE, in stampa; SIGHELE et al., 2013).

Charadriiformes

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si elencano una concentrazione consistente e segnalazioni in siti inusuali.

129 indd. in Sacca di Scardovari (RO) e 107 indd. tra il Po di Goro e il Po di Tolle il 19 gennaio (F. Zatti, D. Trombin).

1 ind. a Vallese di Oppeano (VR) il 5 marzo (R. Pistollato [1]).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 13 aprile (F. Salvini [5]).

Recurvirostridae

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.

2.420 indd. in Laguna di Venezia, di cui 1.120 in Valle Dogà (VE), il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

5.095 indd. nel Delta del Po (RO) il 19 febbraio (censimenti Sagittaria).

1 ind. nuotava al largo di Lido Campanello sul Lago di Garda (VR) il 16 marzo, per poi prendere il volo (E. Stival, M. Cargasacchi et al. [4]).

2 indd. a Montalto di Nogara (VR) il 19 aprile (M. & G. Sighele, R. Vignola [1]).

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR) tra il 18 e il 21 maggio (M. Sighele et al. [1]).

Burhinidae

Occhione *Burhinus oedicnemus*

Si elencano le segnalazioni in provincia di Treviso, dove è presente l'unica area regionale di nidificazione, e un sito inusuale.

1 ind. lungo l'Adige nei pressi di Mambrotta, San Martino B/A (VR), il 9 aprile (R. Pistollato [1]).

Nel medio corso del Piave (TV) segnalazioni a partire dal 16 aprile, con almeno 16 cpp. che hanno poi nidificato tra Ponte della Priula e Saletto di Piave (F. Zanatta, A. Barbon, G. Silveri et al.), quindi in aumento rispetto agli anni precedenti (BARBON et al., 2013); nel periodo postriproduttivo massima concentrazione di 48 indd. a fine novembre e successive segnalazioni di almeno 6-7 indd. rimasti in zona per tutto l'inverno (A. Barbon, F. Zanatta et al.).

Si tratta del primo caso accertato di svernamento in Veneto dopo le segnalazioni tardo autunnali degli ultimi quattro anni e il recupero di 1 ind. deceduto nel dicembre 2012 (SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012, 2013).

Glareolidae

Pernice di mare *Glareola pratincola*

Si elencano informazioni relative alla nidificazione.

La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 6-12 cpp. frazionate in diverse valli, principalmente in Valle Ripiego (censimenti Sagittaria). Conteggi massimi di 30 indd. in Valle Ripiego nella prima metà di luglio e 8 indd. ancora presenti il 27 settembre (F. Piccolo, A. Bossi [4]).

Charadriidae

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*

Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 28 settembre, con anello italiano "IVT" (E. Stival, M. Cargasacchi [4]); era stato inanellato come individuo del primo anno due settimane prima alle Saline di Comacchio (FE) il 15 settembre (archivio ISPRA).

Fratino *Charadrius alexandrinus*

Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.

1 f. al Lido di Venezia tra il 25 aprile e il 16 agosto, con anello italiano "DN" (O. Trebbi, M.G. Mitri); era stata inanellata da adulta nell'aprile 2010 proprio al Lido di Venezia e qui osservata ogni anno da allora (archivio ISPRA).

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Si elencano segnalazioni in sito o in periodo inusuale.

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 15 agosto (F. Zanatta).

1 ind. a Ca' Emo, Adria (RO), il 28 settembre (D. Trombin).

1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 20 ottobre (T. Meneghello).

Scolopaciidae

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Si riporta la concentrazione più consistente.

54-108 ind. in Valle Ca' Pisani (RO) tra il 5 e il 19 febbraio (L. Boscain, R. Maistri, M. Crivellari et al.).

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Si elencano concentrazioni consistenti.

27.289 ind. in Laguna di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).

5.900 ind. in Valle Chiusa (RO) il 9 aprile (E. Verza, L. Zanella).

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

1 ind. in Sacca di Bottonera (RO) il 4 maggio (L. Ravizza [3] [4]).

2 ind. in Sacca di Scardovari (RO) l'1 settembre (G. Dalle Vedove [5]).

Crocolone *Gallinago media*

1 ind. a Isola della Scala (VR) il 16 marzo (G. Dalle Vedove et al. [1]).

1 ind. a Chioggia (VE) il 24 ottobre (D. Trombin [4]).

Pittima reale *Limosa limosa*

Si elencano la concentrazione più consistente e segnalazioni in periodo invernale o in sito inusuale.

1 ind. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (M. Basso, A. Sartori).

1.000 ind. in Valle Ca' Pisani (RO) l'11 marzo (M. Passarella).

3 ind. a Montalto di Nogara (VR) il 16 marzo (M. & G. Sighele, R. Lerco et al. [1]).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale o in sito inusuale.

15 indd. tra il Po di Goro e il Po di Tolle (RO) il 9 gennaio (D. Trombin, F. Zatti [5]).

1 ind. sul Piave a Isola di Papadopoli (TV) il 15 settembre (F. Zanatta).

4 indd. in Laguna Sud di Venezia il 18 dicembre (L. Sattin [5]).

Chiarlo piccolo *Numenius phaeopus*

Si riporta la concentrazione più consistente.

250 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 aprile (L. Boscain [2] [4]).

Chiarlo maggiore *Numenius arquata*

Si riporta la concentrazione più consistente.

1.976 indd. in Laguna di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Si elencano la concentrazione più consistente e una segnalazione al di fuori dell'ambiente costiero.

2 indd. a Montalto di Nogara (VR) il 26 e il 28 luglio (D. Aldi, G. Dalle Vedove [1] [5]).

30 indd. a Boccasette, Porto Tolle (RO), il 20 agosto (C. Nava, L. Prada [5]).

Voltapietre *Arenaria interpres*

Si elencano la concentrazione più consistente e una lunga permanenza in sito poco noto.

40-41 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 12 e il 28 febbraio (M. Crivellari et al. [5]).

3-5 indd. regolarmente osservati in Laguna centrale di Venezia tra il 10 settembre e il 21 gennaio (F. Scarton).

Stercorariidae**Labbo *Stercorarius parasiticus***

1 ind. al largo del Lido di Venezia il 18 aprile e 3 indd. il 19 aprile (B. Moretti, S. Castelli, M.G. Mitri [2] [4]).

1 ind. a Ca' Savio e a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), il 27 e il 28 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).

1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 29 luglio (L. Sattin [5]).

3 indd. alla foce del Po di Maistra (RO) il 21 agosto (D. Trombin).

1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 2 e il 7 settembre (C. Izzo, M. Allen, C. Zanini, G. Dalle Vedove et al. [1]).

1 ind. a Eraclea Mare (VE) il 16 settembre (G. Sgorlon).

1 ind. a Barricata (RO) il 28 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi [4]).

1 ind. in Busa Dritta di Pila (RO) il 19 ottobre (D. Trombin, E. Verza, L. Zanella).

1 ind. a Valliera di Adria (RO) il 26 ottobre (P. Ronconi).

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

1 ind. a Boccasette (RO) il 28 aprile (D. Trombin).

1 ind. del 1° anno nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 5 e l'8 settembre (S. Mazzotti, M. Sighele et al. [1] [5]).

Laridae

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

1 ind. a Venezia tra il 16 dicembre 2012 e il 6 febbraio (S. Castelli, M.G. Mitri, A. Pastorini et al. [2] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

2 indd. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 23 marzo (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).

1 ind. al Lido di Venezia il 2 giugno (S. Castelli [2] [4]).

Con queste sopraelencate, dovrebbero ora essere nove le segnalazioni venete in questo secolo.

Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*

1 ind. in Laguna di Caleri (RO) l'8 gennaio (L. Boscain, F. Zatti [5]).

1 ind. in Valle Veniera (RO) il 2 marzo (M. Passarella).

1-10 indd. tra Valle Scanarello e Valle Bagliona (RO) tra il 28 aprile e il 27 agosto (M. & L. Crivellari, A. Pietrobon et al. [5]).

1 ind. a Boccasette (RO) il 20 agosto (L. Prada, C. Nava [4]).

1 ind. in Valle Veniera (RO) il 28 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi [4]).

28 indd. in Valle Cannelle (RO) e 3 indd. in Valle Sagreda (RO) il 2 novembre (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Bossi [4]).

6 indd. in Valle Spolverina (RO) il 21 novembre (A. Bossi [5]).

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Si elencano segnalazioni di individui marcati.

1 ind. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), tra ottobre 2012 e l'1 gennaio, marcato con anello metallico ceco (M. Sighele et al.); era stato inanellato da adulto in Repubblica Ceca a Staré Město nel luglio 2009 ed è stato segnalato da allora ogni inverno proprio a Lido Fornaci (cfr. SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012, 2013).

1 ind. a Chioggia (VE) tra novembre 2012 e il 28 febbraio e successivamente tra il 24 ottobre e il 21 dicembre, marcato con anello serbo "Y041" (E. Stival, L. Sattin et al.); era stato inanellato da adulto in Serbia sul Lago Palicko nell'aprile 2007 e da allora è stato osservato tutti gli inverni proprio a Chioggia (archivio ISPRA).

1 ind. a Venezia e al Lido di Venezia tra il 22 dicembre 2012 e il 21 gennaio, marcato con anello ungherese "HV48" (E. Stival, M.G. Mitri, P. Vacilotto); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Szeged nell'aprile 2009 (archivio ISPRA).

1 ind. a Quinto di Treviso il 18 gennaio, marcato con anello metallico della Repubblica Ceca (F. Salvini [5]).

1 ind. a Oriago di Mira (VE) il 7 febbraio, marcato con anello tedesco (L. Sattin).

1 ind. a Tessera (VE) il 3 marzo, marcato con anello ungherese "H81J" (E. Stival); era stato inanellato da pullo in Ungheria a Bugyi nel giugno 2011 (archivio ISPRA).

1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 20 luglio e il 28 dicembre, marcato con anello croato "S219" (E. Stival, M. Cargasacchi, G. Zogno); era stato inanellato da adulto in Croazia a Jakusevec (Zagabria) nel gennaio 2010 (archivio ISPRA).

1 ind. a Giare di Mira (VE) il 14 settembre, marcato con anello polacco (L. Sattin).

1 ind. a Chioggia (VE) il 9 novembre e l'1 dicembre, marcato con anello ungherese "HRRL" (E. Stival, M.G. Mitri et al.); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Sopron nel marzo 2013 (archivio ISPRA).

1 ind. a Chioggia (VE) tra il 21 dicembre e il 7 gennaio 2014, marcato con anello ungherese "HR3U" (E. Stival, M. Cargasacchi, L. Sattin); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Szeged nel marzo 2013 (archivio ISPRA).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Si elencano concentrazioni interessanti, una colonia numerosa, segnalazioni in siti non costieri e individui marcati.

1.657 indd. in Laguna di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).

1 ind. del 2° anno alle Grave di Ciano (TV) l'11 marzo (L. Boscain [2]).

1 ind. a Pozzonovo (PD) il 31 marzo (A. Tonelli [5]).

La specie ha nidificato in Valle San Carlo (RO) con almeno 200 cpp. (E. Verza, L. Zanella).

1 ind. a Malamocco (VE) il 2 agosto, marcato con anello francese (L. Sattin).

1 ind. del 1° anno nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 22 settembre (R. Lerco, O. Braga [1]).

892 indd. alla Laguna del Mort (VE) il 10 ottobre, tra i quali 2 indd. marcati con anello ungherese (G. Sgorlon).

Zafferano *Larus fuscus*

Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.

1-2 indd. a Chioggia (VE) tra il 15 ottobre 2012 e il 28 febbraio (M. Passarella, E. Stival, L. Sattin et al. [2] [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

1-2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 4 e il 9 gennaio e successivamente il 12 febbraio (M. Passarella, F. Fioravanti [5]).

2 indd. a Lugugnana (VE) il 16 marzo (L. Boscain [5]).

1-3 indd. a Chioggia (VE) nel mese di novembre (S. Bottazzo, E. Stival et al.).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.

3-5 indd. a Chioggia (VE) tra il 13 dicembre 2012 e il 16 marzo, uno marcato con anello finlandese (L. Boscain, F. Zanatta, M. Passarella, L. Sattin, E. Stival et al. [2] [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

31 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).

2-6 indd. a Chioggia (VE) tra il 30 novembre e il 24 gennaio 2014 (L. Sattin et al. [5]).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Si elencano individui marcati.

1 ind. a Chioggia (VE) il 3 gennaio, marcato con anello croato "S5Z2" (E. Stival); era stato inanellato da pullo in Croazia sull'isola di Revera nel maggio 2009 ed era stato osservato a Chioggia anche nel dicembre 2009, nell'ottobre 2010, nel marzo 2012 e successivamente in novembre e dicembre 2012 (archivio ISPRA).

1 ind. a Chioggia (VE) l'8 febbraio, marcato con anello polacco (L. Sattin).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.

3-10 indd. a Chioggia (VE) tra il 26 novembre 2012 e il 22 febbraio, 2 indd. marcati con anello polacco (L. Sattin, L. Boscain, M. Passarella, E. Stival et al. [2] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

2 indd. alle Grave di Papadopoli (TV) il 13 gennaio (L. Boscain [5]).

2 indd. a Lugugnana (VE) il 16 marzo (L. Boscain [5]).

1-11 indd. a Chioggia (VE) tra il 24 ottobre e il 15 febbraio 2014 (L. Sattin et al. [2] [4]).

Larus argentatus* x *Larus cachinnans

1 ind. a Verona il 19 gennaio, marcato con anello polacco "6P39" (M. Sighele, C. Izzo, R. Lerco, C. Chiappisi [1]); era stato inanellato da pullo nato da coppia mista in Polonia a Wloclawek, fiume Vistula, nel maggio 2004 (archivio ISPRA) ed era già stato osservato a Verona anche nel gennaio 2012 (cfr. SIGHELE et al., 2013).

Sternidae

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

Si elencano segnalazioni relative alla riproduzione o in siti al di fuori dell'ambiente costiero.

La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con circa 250 cpp. perlopiù in Valle Ca' Zuliani e in Valle Morosina (E. Verza, D. Trombin et al.).

2 indd. in una risaia allagata a Calcinaro di Nogara (VR) il 14 giugno (A. Petronio, M. & G. Sighele, R. Vignola [1]).
3 indd. nei pressi di Caldogno (VI) il 4 luglio (L. Sebastiani [5]).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

3 indd. a Roverchiara (VR) il 6 aprile (P. Bertini, C. Izzo, M. D'offria, C. Chiappisi [1]).
1 ind. a Quinto di Treviso il 6 aprile (L. Boscain [5]).

Mignattino comune *Chlidonias niger*

Si riporta una concentrazione consistente.

1.000 indd. ca. in Sacca di Scardovari (RO) il 20 agosto (L. Prada, C. Nava [5]).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

30 indd. alla Busa di Giarretta (PD) il 20 aprile, 5 indd. il 21 aprile, 2 indd. il 12 maggio (D. De Marchi, F. Moretto [5]).
10 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 aprile, 5 indd. il 27 maggio (D. De Marchi, D. Bacchin, A. Nardo [5]).
1-2 indd. tra il Bacchiglione e il Brenta nei pressi di Chioggia (VE) tra il 27 aprile e il 13 maggio, ma 25 indd. l'8 maggio (F. Piccolo, M. Passarella et al. [2] [4]).
8 indd. alla Palude di Cona (VE) l'8 maggio, 2 indd. il 9 maggio (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
Almeno 2 indd. nel Golfo di Peschiera d/G (VR) il 9 giugno (M. Sighele, R. Vignola [1]).
1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 6 e il 13 luglio (A. Bossi, M. Busato et al. [5]).
1 ind. a Tessera (VE) il 9 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).

Beccapesci *Sterna sandvicensis*

Si elencano informazioni sulla nidificazione in provincia di Rovigo e un individuo marcato.

La specie ha nidificato in Valle San Carlo (RO) con almeno 40 cpp. (E. Verza, L. Zanella).

1 ind. a Malamocco (VE) il 23 agosto, marcato con anello italiano "IZP" (E. Stival, R. Faè, L. Sattin); era stato inanellato da adulto alle Saline di Comacchio (FE) nell'aprile 2010 ed era stato osservato a Malamocco anche in ottobre-novembre 2011 e in novembre 2012, mentre in periodo riproduttivo è stato segnalato regolarmente al Lago Pomorie in Bulgaria, sul Mar Nero (archivio ISPRA).

Psittaciformes

Psittacidae

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

Si elencano segnalazioni da località nuove per la specie.

Dall'abitato di Peschiera d/G (VR) la specie si è diffusa verso sud al laghetto del Frassino, dove 1 cp. ha nidificato, e lungo il corso del Mincio (S. Tascio, G. Dalle Vedove, M. Cordioli, S. Barugola et al. [1]).

1 ind. a Bonavicina (VR) il 2 marzo (M. Cargasacchi, E. Stival [5]).
1 ind. in foro di albero in golena di Badia Polesine (RO) il 6 aprile (G. Susanna [4]).

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

Si elencano la conferma di un sito riproduttivo di recente insediamento e un sito inusuale.

19 indd. a Papadopoli (TV) il 15 febbraio (G. Sgorlon).

4-5 cpp. hanno nuovamente nidificato a Villa Bartolomea (VR) a marzo, segnalati anche in maggio (A. Micheletti, G. Rigo [1]).

Cuculiformes**Cuculidae****Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius***

1 ind. ad Alberoni (VE) il 23 marzo (L. Panzarin).

1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 12 e il 30 maggio (G. Sgorlon, L. Panzarin [2]).

1 juv. che si accompagnava a due gazze a Tribano (PD) il 19 giugno (A. Tonelli [2] [3] [4]).

1 juv. che si accompagnava a due gazze a Bottrighe, Adria (RO), il 24 giugno (D. Trombin [4]).

Strigiformes**Strigidae****Civetta nana *Glaucidium passerinum***

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. nel Vajo dei Modi in Lessinia (VR), il 27 gennaio (P. Parricelli [1]).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1-3 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) tra il 23 dicembre 2012 e l'8 aprile (M. Passarella, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

1 ind. in Sacca del Canarin (RO) l'8 aprile (L. Zanella, R. Giubilato [4]).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 10 e il 28 aprile (F. Zanatta, A. Luchetta [5]).

1 ind. in Valle Cannelle (RO) il 23 aprile (A. Tonelli [5]).

1 ind. raccolto a Mestre (VE) il 24 aprile (L. Panzarin).

1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 25 aprile (L. Sattin [5]).

1 ind. in Valle Olivari (VE) il 9 maggio (A. Pastorini [5]).

3 indd. a Vigasio (VR) il 25 maggio, 1 ind. il 26 maggio (A. Mosele [5]).

1 ind. a Teglio Veneto (VE) il 26 maggio (M. Ballan).

1 ind. a Tessera (VE) il 17 dicembre (L. Panzarin).

3 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 28 dicembre, poi 1 ind. nel gennaio 2014 (M. Crivellari et al. [4]).

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. recuperato debilitato a Spresiano (TV) il 10 febbraio (MEZZAVILLA & FRASSON, 2014).

Apodiformes**Apodidae****Rondone pallido *Apus pallidus***

1 juv. da poco involato recuperato a Venezia il 30 settembre, con le ultime tre remiganti ancora in crescita (G. Cherubini, L. Panzarin).

2 indd. a San Donà di Piave (VE) il 4 novembre (G. Sgorlon [2]).

La segnalazione del giovane recuperato a Venezia rappresenterebbe il primo dato relativo alla riproduzione di questa specie in Veneto.

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Almeno 2 cpp. hanno nidificato nel comune di Villa Bartolomea (VR), con prime osservazioni a partire dal 27 aprile,

adulti in copula l'1 giugno, adulti con imbeccata il 30 giugno, presenza rilevata fino al 3 settembre (G. Rigo, M. Sighele, C. Izzo et al. [1]).

Nidificazione di 1 cp. nei pressi dell'aeroporto di Verona Villafranca (VR), con osservazioni di 1 ad. il 21 e il 22 maggio e successivamente di 1 juv. il 22 e il 23 luglio (E. Ferando et al.).

Nidificazione accertata di 5 cpp. a Stretti, in Tenuta Pasti e in Bonifica del Loncon nei comuni di Eraclea e Caorle (VE), con prime osservazioni a partire dal 13 maggio, adulti con imbeccata tra la fine di giugno e metà agosto (L. Panzarin, U. Battistella, G. Sgorlon, A. Nardo, S. Bottazzo, E. Stival, F. Piccolo, M. Cargasacchi et al. [2] [4] [5]). Inoltre 1 ind. a Valle Vecchia l'1 giugno (L. Benatelli, M. Panzarin).

Nidificazione accertata per la prima volta in provincia di Vicenza con 1 cp. nel comune di Orgiano in vecchio nido di picchio verde, con l'osservazione di adulto con imbeccata l'1 luglio e di almeno due pulli a metà luglio (L. Sebastiani, F. Pegoraro, S. Dal Cengio).

1-2 indd. a San Basilio (RO) tra il 2 maggio e il 9 luglio (P. Ronconi, M. Crivellari, S. Rasi Caldogno et al. [4] [5]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) dal 26 maggio ai primi di agosto (G. Silveri, L. Boscain, T. Abbà et al. [2]).

1 ind. nei pressi di Merlara (PD) il 28 maggio (G. Susanna [5]).

1 ind. lungo Valle Ca' Pisani (RO) il 28 maggio (F. Piccolo, M. Crivellari [4]).

1 ind. in Valle Grassabò (VE) il 29 maggio (F. Piccolo [2] [4]).

1 ind. a Ca' Negra (RO) il 30 maggio (E. Verza [5]).

1 ind. a Corte Val Vecchia, Castagnaro (VR), l'1 giugno (M. Sighele, C. Izzo, M. Allen [1]).

1-2 indd. lungo il Po di Tolle (RO) il 7 e il 10 giugno (P. Melandri, A. Tonelli [5]).

1 ind. nei pressi del Lago Manfrinato (PD) tra il 30 agosto e il 5 settembre (A. Tonelli, M. Busato [5]), non distante da dove 1 cp. aveva nidificato nel 2011 (SIGHELE et al., 2011).

Piciformes

Picidae

Picchio cenerino *Picus canus*

Si elencano segnalazioni al di fuori dell'areale noto.

1 ind. in canto nei pressi di Malga Brione sul Monte Baldo (VR) il 24 aprile (W. Hanschitz).

1 ind. a Cima Grappa (TV) il 27 luglio (E. Stival, A. Bossi, M. Cargasacchi).

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

Si conferma la presenza in periodo riproduttivo in Valbelluna nei comuni di Belluno, Cesiomaggiore e Feltre (BL) con osservazioni tra il 5 gennaio e il 12 maggio (N. Barp, C. de Francesco, B. Gallon, M. Varaschin, D. Quaranta). 2 indd. ad Auronzo di Cadore (BL) il 16 novembre (A. Peri [5]).

Picchio tridattilo *Picoides tridactylus*

1 ind. in Val del Grisol (BL) il 28 febbraio (O. Mazzucco [5]).

Passeriformes**Laniidae****Averla cinerina *Lanius minor***

- 1 ind. a Breganze (VI) il 7 maggio (E. Borghesan [5]).
- 1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 27 maggio (G. Silveri [5]).
- 1 ind. a Rivà, Ariano nel Polesine (RO), il 31 maggio (P. Melandri [5]).
- 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 giugno (P. Vacilotto).
- 1 ind. a Punta Paltanara (RO) il 26 giugno (F. Piccolo [5]).
- 1 ind. a Ponte Crepaldo, Eraclea (VE), tra il 9 e il 31 luglio (G. Sgorlon [2]).

Averla capirossa *Lanius senator*

- 1 ind. a Motta di Villa Bartolomea (VR) il 17 maggio (G. Rigo [1]).
- 1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 20 maggio (P. Vacilotto [4]).
- 1 ind. nei pressi di Mel (BL) l'8 giugno (M. Villa [5]).

Corvidae**Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus***

Si riporta una segnalazione a quota inusuale.

- 50 indd. ca. a Garda (VR) nella seconda metà di febbraio (L. Longo [1]).

Gazza *Pica pica*

Si elencano aberrazioni di piumaggio.

- 1 ind. albino a Santa Maria Maddalena (RO) il 16 marzo (M. Zappaterra).
- 1 ind. isabellino a Grignano Polesine (RO) in novembre (L. Zanella)

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*

Si riporta una segnalazione a quota inusuale.

- 1 ind. a Mogliano Veneto (TV) tra gennaio e marzo (G. Zago).

Taccola *Corvus monedula*

Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in quota.

- 450 indd. ca. al roost serale di Ca' Dolfìn in Po di Tolle (RO) il 5 febbraio (L. Bedin).
- 1 ind. a Erbezzo (VR), 1.100 m s.l.m., il 18 maggio (C. Izzo [1]).
- 15 indd. a Dosso Alto in Lessinia (VR), 1.330 m s.l.m., il 21 settembre (C. Izzo, C. Zanini [1]).
- 130 indd. ca. in un roost serale a Belluno il 30 dicembre (F. Mezzavilla, G. Martignago).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

- 1 ind. a Meduna di Livenza (TV) il 26 gennaio (G. Sgorlon [5]).
- 1 ind. a Isola d/S (VR) il 23 febbraio (C. Izzo, G. Dalle Vedove [1]).
- 1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 26 febbraio (C. Zanini [1]).
- 6 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 ottobre (E. Stival et al. [2]).
- 4 indd. a Sommacampagna (VR) il 17 ottobre (C. Zanini).
- 8 indd. a Torreselle, Piombino Dese (TV), il 31 ottobre (F. Salvini [5]).

Cornacchia nera *Corvus corone*

Si elencano segnalazioni in pianura in periodo inusuale.

- 1 ind. a Melara (RO) l'8 maggio (G. Rigo [1]).
- 1 ind. a Vallesina, Marcon (VE), il 15 maggio (E. Stival [2]).
- 1 ind. a Negrisia (TV) il 15 maggio (G. Sgorlon [2]).
- 1 ind. a Mestre (VE) il 18 maggio (A. Luchetta [5]).
- 1 ind. a Montegrotto Terme (PD) l'11 giugno (G. Piras [5]).
- 1 ind. a Cal dea Piera, Oderzo (TV), il 21 giugno (G. Sgorlon [2] [4]).

Cornacchia grigia *Corvus cornix*

Si riporta la concentrazione più consistente.

8.049 indd. in un roost serale all'Isola dei Morti, Sernaglia della Battaglia (TV), il 14 dicembre (F. Mezzavilla, G. Martignago, F. Salvini, G. Malagola).

Paridae**Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus***

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

- 1 ind. in canto a Bibione (VE) il 10 aprile (L. Panzarin).

Panuridae**Basettino *Panurus biarmicus***

Specie molto scarsa e localizzata, probabilmente nidificante in regione solo a Valle Vecchia di Caorle (VE) e oggi assai scarsa anche alla Palude del Busatello (VR); si elencano le segnalazioni al di fuori di queste due località.

- 1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 5 gennaio (C. Izzo [1]).
- 3 indd. alla Palude di Cona (VE) il 13 maggio, 4 indd. il 26 luglio (A. Schneider, R. Storer [2] [5]).

Timaliidae**Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea***

Si elencano le segnalazioni al di fuori dei Colli Euganei (PD), dove la specie si è insediata da diversi anni.

Si conferma la presenza della specie al confine tra le province di Verona e Vicenza, comuni di San Giovanni Ilarione (VR) e Chiampo (VI), con segnalazione di 1 cp. il 7 aprile (M. Sighele, R. Vignola [1]).

- 1 ind. in canto a Fara Vicentino (VI) il 14 aprile (C. Zanussi [5]).

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*

Si elencano segnalazioni al di fuori della Lessinia (VR), unica area regionale di presenza consistente e regolare sia in periodo riproduttivo che invernale.

2 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) l'8 aprile (A. Bossi [5]).

2 indd. nei pressi di Rubbio, Bassano d/G (VI), il 14 aprile (S. Tasca [5]).

1 ind. in canto alle Grave di Ciano (TV) il 26 maggio (L. Boscain, T. Abbà, D. De Marchi [2] [5]).

4 indd. a Monselice (PD) il 16 novembre (G. Zogno [4]).

Hirundinidae

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'1 aprile (A. Pastorini [2]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 agosto (G. Sgorlon [5]).

2 indd. in Valle Dogà (VE) il 17 settembre (M. Bon [2]).

Phylloscopidae

Lù forestiero *Phylloscopus inornatus*

1 ind. inanellato a Saletto (PD) l'8 ottobre (A. Frigo).

1 ind. alla Palude del Busatello (VR) il 27 ottobre (F. Novelli, M. Pesente [1]).

Dovrebbero rappresentare la quarta e la quinta segnalazione per il Veneto, le prime per le province di Padova e Verona (BRICHETTI & FRACASSO, 2010; SIGHELE et al., 2012).

Lù piccolo *Phylloscopus collybita*

Si elencano segnalazioni relative alla ssp. *tristis* (lù siberiano).

1 ind. a Quinto di Treviso il 6 aprile (L. Boscain [4] [5]).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 28 novembre (F. Zanatta).

1 ind. a Favaro Veneto (VE) l'1 dicembre (E. Stival [2] [5]).

1 ind. a Carità di Villorba (TV) il 5 dicembre (L. Boscain [4] [5]).

1 ind. a Spresiano (TV) il 13 dicembre (G. Sgorlon).

Sylviidae

Beccafico *Sylvia borin*

Si riporta un individuo marcato.

1 ind. catturato durante una seduta di inanellamento in Valle Ghebo Storto (PD) il 31 agosto, marcato con anello polacco (L. Sattin).

Sterpazzolina comune *Sylvia cantillans*

- 1 ind. a Lavacchi (PD) il 22 marzo (F. Scarton [5]).
 1 ind. a Mestre (VE) il 26 marzo (E. Stival [2] [4]).
 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 aprile, 4 indd. l'8 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto [2] [4]).
 1 ind. inanellato a Saletto (PD) il 6 aprile (A. Frigo).
 2 indd. a Ca' Mello (RO) il 7 aprile (G. Piras, C. Fassina [4]).
 1 ind. a Treviso il 7 aprile (R. Storer [5]).
 1 ind. a Boccasette (RO) l'8 aprile (M. Crivellari [5]).
 1 ind. inanellato in Valle Ghebo Storto (PD) il 10 aprile (L. Sattin [5]).
 1 ind. a Grumolo Pedemonte, Zugliano (VI), il 12 aprile (L. Sebastiani [5]).
 1 ind. a Padova il 12 aprile e 1 ind. il 14 aprile (G. Piras, C. Fassina [5]).
 2 indd. a Lozzo Atestino (PD) il 18 maggio (G. Piras [5]).
 2 indd. a Semonzo (TV) il 22 maggio (R. Levert [5]).
 2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 30 maggio (A. Tonelli [4]).

Locustellidae

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

- 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 26 aprile (L. Sattin [5]), catturato durante una seduta di inanellamento.
 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 5 ottobre (L. Sattin [5]), catturato durante una seduta di inanellamento.

Salciaiola *Locustella luscinioides*

Si elencano segnalazioni durante il periodo riproduttivo.

- 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 giugno (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
 1 ind. in Cassa di Colmata D/E (VE) il 17 giugno (F. Scarton).

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

15-24 indd. in Lessinia occidentale (TN/VR) tra il 18 dicembre 2012 e la prima decade di gennaio (T. Borghetti, R. Lerco, L. Signori, G. & M. Sighele et al. - SIGHELE & PARRICELLI, 2013). Successivamente in Lessinia (VR) fino a 55 indd. in Val Sguerza tra il 15 e il 27 gennaio (B. & V. Corradi, G. Perlato, M. Sighele, R. Lerco, P. Panarotto et al. [1]), 1-4 indd. a Campofontana e a Maregge in gennaio (P. Panarotto, E. Sauro [1]), 1 ind. sopra Roncà il 17 gennaio (D. Stocchero, G. De Grati), 30 indd. ai Parpari il 13 febbraio (M. D'offria [1]), 4 indd. a Finco il 5 marzo (P. Panarotto).

Fino a 60 indd. sull'Altopiano di Asiago a Camporovere, Asiago, Sasso, Foza, Lazzaretti, Tombal, Cornetta (VI) tra il 21 dicembre 2012 e il 22 febbraio (R. Cappellaro, R. Martelli, F. Nardin, A. Rigoni, R. Basso, P. Panarotto, S. Rima et al. [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013). Inoltre 18 indd. sul Monte Grappa (VI) il 6 gennaio (F. Colla) e 30-100 indd. tra Recoaro Mille e Fongara (VI) nelle prime due decadi di febbraio (P. Panarotto, S. Rima et al.).

Sempre in provincia di Vicenza: 4 indd. in Val Leogra il 20 gennaio (R. Zordan), 2 indd. a Torreselle il 25 gennaio (F. Pegoraro), 6 indd. a Rubbio, Conco, il 28 gennaio (M. Paganin [5]) e in seguito 21 indd. tra Alto e Tortimo il 27 e il 28 febbraio (G. Schivo, P. Panarotto, V. Poli et al.), 11 indd. ad Altissimo tra il 20 e il 26 febbraio (F. Pegoraro).

2 indd. a Feltre (BL) l'1 gennaio (N. Barp, M.E. Bibelia) e 10 indd. a Spert, Farra d'Alpago (BL), il 12 febbraio (G. Tormen [5]).

In provincia di Treviso 1 ind. a Montebelluna il 29 gennaio (C. Poloni [5]), 1 ind. a Castelfranco Veneto l'1 e il 2 febbraio (P. Rossato [5]) e 35-40 indd. a Pederobba tra l'8 e il 13 aprile (S. Barbisan, G. Silveri [5]).

30-52 indd. tra Mussolente (VI) e San Zenone degli Ezzelini (TV) tra il 20 marzo e il 6 aprile (S. Tasca, F. Zanatta, D. De Marchi et al. [5]), dove erano stati osservati anche nel 2009 (SIGHELE et al., 2009).

1 ind. a Bovazecchino (RO) il 23 marzo (G. Susanna [5]).

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris*

Si riporta una concentrazione consistente.

Roost di 25.000 indd. a Garda (VR) nel mese di febbraio (L. Longo [1]).

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

1 ind. sulle rive dell'Adige a San Vito al Mantico, Bussolengo (VR), il 19 gennaio (V. Fanelli, V. Grippo [1]).

1 ind. posato su una barca nel lago di Garda a Val di Sogno, Malcesine (VR), il 20 gennaio (G. Dalle Vedove [1]).

1 ind. sul Brenta a San Giorgio in Bosco (PD) il 26 gennaio (C. Fassina, G. Piras [5]).

Muscicapidae

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

Si riporta una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) il 10 aprile (A. Tonelli [5]).

Pettiroso *Erithacus rubecula*

Si elenca una segnalazione inusuale per località e periodo.

1 ind. nel Parco Langer di Rovigo il 24 luglio (M. Pegorer).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 ind. alla Palude di Onara (PD) il 27 aprile (F. de Pascalis [5]).

1 ind. sul Monte Zogo (TV) l'1 maggio (T. Abbà [5]).

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 19 settembre (G. Sgorlon [2] [4]).

1 ind. inanellato a Saletto (PD) il 2 ottobre (A. Frigo).

Codirossone *Monticola saxatilis*

Si riporta una segnalazione a bassa quota.

1 ind. all'Oasi Cave di Gaggio Nord (VE) il 28 maggio (M. Chillon).

Monachella *Oenanthe hispanica*

1 m. ssp. *melanoleuca* della forma a gola nera tra le cave nei pressi di Fosse, Sant'Anna d'Alfaedo (VR) tra l'1 giugno e l'1 luglio (V. Grippo, V. Fanelli, M. & G. Sighele et al. [1]).

Motacillidae

Calandro maggiore *Anthus richardi*

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 24 settembre (F. Zanatta, F. Piccolo).

Specie di comparsa irregolare in regione, l'ultima comparsa nota è riferita al 2010 (SIGHELE et al., 2011); dovrebbe trattarsi della prima segnalazione per la provincia di Treviso.

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

1 ind. a Mestre (VE) il 12 e il 13 marzo (A. Bossi, E. Stival [2]).

Passeridae

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Si elenca una concentrazione consistente.

Oltre 100 indd. a Bocca di Selva, Lessinia (VR), nella prima decade di febbraio (P. Parricelli, B. Dentesani, A. Tonelli et al. [1] [4]).

Fringillidae

Venturone alpino *Carduelis citrinella*

1 ind. in Valfredda sul Monte Baldo (VR) il 9 agosto (A. Sala, E. Frigerio et al.).

2-4 indd. sulla Dorsale Prealpina Cesen/Visentin (TV/BL) tra l'11 novembre e il 7 dicembre (M. Varaschin, G. Tormen, L. Boscain [4] [5]).

5-20 indd. nell'Altopiano di Asiago a Pubel, Foza (VI), tra la metà di novembre e febbraio 2014 (R. Cappellaro, M. Paganin).

Organetto *Carduelis flammea*

Si elencano segnalazioni a bassa quota.

1 ind. a Domegliara, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), il 26 gennaio (M. Ovatoli).

1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 16 novembre (M. Faccioli et al. [1]).

Crociere *Loxia curvirostra*

Si elencano segnalazioni a bassa quota.

10 indd. al Lido di Venezia il 13 gennaio e 2 indd. l'11 aprile (M. Bon, L. Panzarin).

1 ind. alle sorgenti dello Storga, Treviso, il 24 aprile (L. Boscain [5]).

Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus*

1 ind. a Ca' Noghera (VE) il 7 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi).

Specie di comparsa irregolare in regione, l'ultima comparsa nota risale al 2004 (BON et al., 2005); confermata dal GSR.

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

2-12 indd. in Lessinia (VR) tra il 3 e il 30 dicembre 2012 e successivamente 19 indd. in gennaio, poi man mano in numero sempre meno cospicuo fino al 13 aprile (M. D'offria, M. Sighele, P. Parricelli, V. Fanelli, C. Izzo, E. Tonolli, L. Mazzola, M. Melotti et al. [1] - SIGHELE & PARRICELLI, 2013).

Fino a 12 indd. a San Nicolò del Lido, Venezia, tra il 9 e il 26 gennaio (M.G. Mitri, S. Castelli, G. Antinori et al.).
3 indd. alle foci del Brenta (VE) il 15 gennaio (L. Sattin [5]).

2 indd. a Malga Pezza, Limana (BL), il 26 novembre (G. Tormen).

4 indd. a Bocca di Selva, Lessinia (VR), il 28 novembre, quindi fino a 30 indd. durante il mese di dicembre, gruppo ancor più numeroso nei primi mesi del 2014 (M. Melotti, R. Lerco, M. Samaritani, M. Cordioli, P. Parricelli et al. [1]).

7 indd. sul Monte Longara di Gallio (VI) il 30 novembre (A. Bartoli [5]).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

1 ind. nella zona delle risaie tra Isola d/S, Trevenzuolo e Vigasio (VR) il 23 febbraio, nello stesso sito dove era stato osservato anche a novembre e dicembre 2012 (C. Izzo, G. Dalle Vedove et al. [1] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

La specie è regolarmente segnalata come svernante in Veneto almeno dal 2007/2008, dapprima in provincia di Treviso e successivamente in quella di Verona.

Ortolano *Emberiza hortulana*

Si elencano segnalazioni in siti collinari.

2 indd. alle Grave di Ciano (TV) il 3 maggio (G. Silveri [5]).

1 ind. a Breganze (VI) il 12 maggio (E. Borghesan [5]).

1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 21 maggio (G. Silveri [4]).

1 ind. a Malga Vallina di Sopra in Lessinia (VR) il 27 agosto (C. & A. Bandieri, E. Facchini [1]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. alla cava di Bosco di Rubano (PD) il 24 gennaio e il 23 marzo (G. Piras [5]).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

Fino a 10 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), osservati tutto il corso dell'anno e già segnalati nel 2012 (C. Zanini, E. Tonolli, M. Faccioli, L. Mazzola, E. Cavallini et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

1-2 indd. a Borghetto, Valeggio s/M (VR), osservati tutto il corso dell'anno (E. Cavallini, S. Tascio, M. Sighele, A. Pigozzo et al. [1]).

2 indd. in Valle Perera (VE) il 14 gennaio (S. De Col, G. Tormen).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 febbraio (P. Vacilotto [4]).

1 ind. nella Sacca di Marinetta (RO) il 19 febbraio (L. Cogo, F. Zatti).

2 indd. a Calmasino (VR) il 27 febbraio (M. Azzolini, F. Viglia [1]).

1 ind. in Valle Pozzadini (RO) l'1 aprile e in Valle Sagreda (RO) il 19 aprile (E. Stival, M. Passarella [5]).

2 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 12 maggio e il 14 settembre (F. Moretto [5]).

1-2 indd. a Borghetto, Valeggio s/M (VR), tra il 13 ottobre e l'11 dicembre (M. Sighele, A. Pigozzo [1]).

2 indd. a Cisano di Bardolino (VR) il 22 novembre (D. Bernasconi [5]).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 ind. sul fiume Lemene (VE) il 15 gennaio (A. Farioli, L. Luchetta).

1 m. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 31 marzo, il 2 aprile e il 12 maggio (M. Sighele, E. Cavallini, M. Faccioli [1]).

1 ind. ad Adria (RO) il 17 maggio (D. Trombin [5]).

1 cp. a Treviso il 23 dicembre (A. Pastorini [5]).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 m. sul Dese a Ca' Bizzassa (VE) il 3 febbraio e il 29 maggio (E. Stival [2] [5]).

1 m. a Silea (TV) il 24 febbraio (R. Storer [5]).

1 m. a Battaglia Terme (PD) il 12 aprile (G. Zogno [5]).

1 f. a Venezia tra la fine di settembre e il 4 ottobre (D. Gallotti).

1 m. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre e gennaio 2014 (M. & G. Sighele, C. Zanini et al. [1]), marcato con anello verde in plastica.

Fischione del Cile *Anas sibilatrix*

1 m. a Mestre (VE) tra il 10 marzo e il 14 luglio (A. Pastorini, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [5]), marcato con anello in plastica.

Tantalo africano *Mycteria ibis*

1 ind. nei pressi di Torretta, Legnago (VR), il 28 marzo (G. Rigo [1]).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

Da registrazioni GPS del progetto del Waldrappteam: 2 indd. tra Belluno e Feltre (BL) tra il 13 e il 16 aprile; 3 indd. dapprima a Thiene (VI) tra il 14 e il 17 aprile, quindi tra Treviso, Isola di Papadopoli e Oderzo (TV) tra il 29 aprile e il 18 maggio (1 ind. osservato da F. Zanatta), ma ancora a Thiene (VI) l'8 maggio; in seguito 2 indd. a Valdobbiadene (TV) tra il 4 e il 6 giugno, mentre 1 ind. è stato recuperato colpito a morte da arma da fuoco il 6 giugno a Basse del Brenta, Cittadella (PD); 2 indd. tra Asiago e Thiene (VI) tra il 18 e il 31 luglio; 2 indd. tra Padova e Vicenza tra il 29 e il 31 luglio; 2 indd. a Verona tra il 5 e il 7 ottobre; 2 indd. a Belluno il 9 ottobre, a Padova il giorno seguente; 7 indd. a Bassano del Grappa (VI) il 19 ottobre; 1 ind. tra Montecchio Precalcino e Thiene (VI) il 26 ottobre; 1 ind. a Vicenza il 6 e il 7 novembre.

3 indd. a Verona il 22 ottobre (C. Izzo [1]).

La specie è segnalata regolarmente dall'inizio del progetto, cioè dal 2003.

Gru coronata *Balearica regulorum*

Si conferma anche nel 2013 la presenza di 1 ind. alla Palude del Busatello (VR), qui segnalato da diversi anni (F. Novelli et al. [1] - cfr. BON et al., 2008; SIGHELE et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Rosella rossa *Platycercus elegans*

1 ind. a Rovigo tra gennaio e febbraio (A. De Poli).

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*

1 ind. a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 9 novembre (D. De Marchi [5]).

Inseparabile facciarosa *Agapornis roseicollis*

1 ind. a Jesolo Lido (VE) il 19 settembre (F. Santin [2]).

Pappagallo del Senegal *Poicephalus senegalus*

1 ind. ad Avesa, Verona, tra l'1 settembre 2012 al 3 luglio (M. Sighele, M. Zara [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013).

APPENDICE

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Ibis eremita *Geronticus eremita*

1 ind. a Lamon (BL) l'8 ottobre 2012 (E. Bottegal), registrato dal GPS dell'individuo anche l'11 ottobre (SIGHELE et al., 2012).

Venturone alpino *Carduelis citrinella*

2 indd. in Valfredda sul Monte Baldo (VR) il 21 maggio 2011 (E. Frigerio et al.).

1 ind. in Valfredda sul Monte Baldo (VR) nel maggio 2012 (E. Frigerio et al.).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e birdwatcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito di questo lavoro. Un ringraziamento a Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton per la revisione dei dati e il contributo critico; a Nicoletta Perco per le segnalazioni satellitari di ibis eremita.

Bibliografia

- BARBON A., GIUNCHI D., PANZARIN L., ROSSI C., 2013. Indagine preliminare sulla presenza dell'occhione (*Burhinus oedicnemus*) nel Piave trevigiano. In: Campobello D., Pedrini P., Ciolli M., Carere C., Chamberlain D., Serra L., XVII Convegno Italiano di Ornitologia, Trento - Programma e Abstract: 72-73.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2003. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 54: 123-160.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2004. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 55: 171-200.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2005. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 56: 187-211.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2006. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2005. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 57: 199-220.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 58: 269-292.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2008. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 59: 129-151.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2010. Ornitologia Italiana. Vol. 6 Sylviidae - Paradoxornithidae. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna, 494 pp.
- DE FRANCESCHI P., 1996. Avifauna veronese. Aggiornamenti e analisi dei fattori ecologici che influiscono sulla dinamica di alcune popolazioni. *Atti Mem. Accad. Agric. Sci. Lett. Verona*, 170: 79-99.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani. Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F., 2011. Checklist degli Uccelli del Veneto (maggio 2010). In: Bon M., Mezzavilla F., Scarton F. (eds.), Atti 6° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, suppl. al vol. 61: 103-117.
- LEPORATI L., PERCO FR., CATTANI V., MATTEDI S., DE FRANCESCHI P., FRACASSO G., PERCO F., RALLO G., 1985. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione Veneto - Giunta Regionale. *Antoniana Spa Industria Grafica*, Padova.
- MASSA R. (a cura di), 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.
- MEZZAVILLA F., FRASSON L., 2014. Su una civetta capogrosso, *Aegolius funereus*, rinvenuta in pianura. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 39: 93-94.

- MORBIOLI M., SIGHELE M., 2006. L'avifauna del Laghetto del Frassino (Peschiera del Garda, Verona, Veneto). *Boll. Mus. civ. St. nat. Verona*, 30: 275-291.
- SANGSTER G., COLLINSON J.G., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., 2010. Taxonomic recommendations for British birds: Sixth Report. *Ibis*, 152: 180-186.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., VOTIER S.C., 2011. Taxonomic recommendations for British birds: Seventh Report. *Ibis*, 153: 883-992.
- SCARTON F., MEZZAVILLA F., VERZA E. (red.), 2013. Le garzaie in Veneto - Risultati dei censimenti svolti nel 2009-2010. *Quaderni Faunistici AsFaVe*, 2, 224 pp.
- SGORLON G., SIGHELE M., in stampa. Rinvenimento di una Gallina prataiola (*Tetrax tetrax* Linnaeus, 1758) in provincia di Venezia e revisione delle segnalazioni della specie in Veneto. *Riv. ital. Orn.*, Milano.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 60: 143-168.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2010. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2009. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 61: 83-115.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2011. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 62: 181-218.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2012. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 63: 135-171.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2013. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2012. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 64: 81-114.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2013. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2012. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*, 32 pp.
- VIOLANI C., BARBAGLI F., 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli. Parte prima: Struthioniformes - Psittaciformes. *Avocetta*, 30 (num. sp.): 5-65.
- ZANETTI M. (a cura di), in stampa. Flora e Fauna della pianura veneta orientale n. 16. Osservazioni di campagna 2013. *Associazione Naturalistica Sandonatese*.
- Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list e dei siti web consultati sono:
Verona BW: www.veronabirdwatching.org
Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw
Deltapobw: www.facebook.com/groups/DeltaPoBW
EBN Italia: www.ebnitalia.it
Ornitho: www.ornitho.it
Migration: www.migration.net